

Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten

1 Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit

1.1 Erwachsene Bevölkerung (18 - 64 Jahre) ¹⁾

N: 7.912, Ausschöpfungsquote 45 %

Konsumform: Alkohol (letzte 30 Tage) im Jahr 2006

	2006				Gesamt
	Männer (M)		Frauen (F)		
Abstinenz (30 Tage)	-	10,3 %	-	18,1 %	14,1 % (7,3 Mio.)
risikoarmer Konsum	> 0-30 g	65,7 %	> 0-20 g	62,7 %	64,2 % (33,4 Mio.)
risikanter Konsum	> 30-60 g	10,0 %	> 20-40 g	5,7 %	7,9 % (4,1 Mio.)
gefährlicher Konsum	> 60-120 g	3,5 %	> 40-80 g	1,3 %	2,4 % (1,25 Mio.)
Hochkonsum	> 120 g	0,6 %	> 80 g	0,1 %	0,4 % (208.000)

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

Ca. 5,56 Mio. (10,7 %) der Bevölkerung weisen einen riskanten, gefährlichen oder Hochkonsum auf.

Prävalenz des Rauschtrinkens (letzte 30 Tage) (%)

(5 oder mehr Gläser Alkohol) ¹⁾

Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	66,7 (34,7 Mio.)	55,2	80,3
1-3 mal	19,6 (10,2 Mio.)	24,8	13,4
4 mal und mehr	13,7 (7,1 Mio.)	20,0	6,2

Häufigstes Rauschtrinken findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 18-20-jährige (37,3 %), gefolgt von den 21-24-jährigen (29,7 %) statt, bei den Frauen sind dies ebenfalls die Hauptgruppen 18-20 Jahre (15,7 %), 21-24 Jahre 13,5 %:

Alkoholabhängigkeit/-missbraucher ¹⁾ 2006 (DSM IV)

	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	2,4 % (1,2 Mio.)	3,4	1,4
Anteil Alkoholmissbraucher	3,8 % (1,9 Mio.)	6,4	1,2

Trends für Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit nach DSM IV bei 18-59-jährigen 1997-2006 ¹⁾ (%)

	Erhebungsjahr		
	1997	2000	2006
Gesamt			
DSM IV Missbrauch	3,4		3,9
DSM IV Abhängigkeit	2,6	2,9	2,6
Männer			
DSM IV Missbrauch	5,4		6,5
DSM IV Abhängigkeit	4,2	4,5	3,6
Frauen			
DSM IV Missbrauch	1,5		1,2
DSM IV Abhängigkeit	1,0	1,2	1,5

1.2 Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004 - 2008: 12-17 Jahre (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Juni 2007, Oktober 2008) ³⁾

1.2.1 Alkoholkonsum Jugendlicher (12-17 Jahre)³⁾

a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)

	Erhebungsjahr		
	2004	2005	2007
alle (weiblich + männlich)	21	19	22
weiblich	16	14	16
männlich	26	23	27

b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: mindestens 1x pro Monat (%)

Erhebungsjahr	2004		2005		2007	
	12-15	16-17	12-15	16-17	12-15	16-17
alle (weiblich + männlich)	10	44	8	39	10	43
weiblich	9	32	7	29	8	31
männlich	12	55	9	49	12	54

c) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Woche (%)

Erhebungsjahr	2004	2005	2007	2008
alle (weiblich + männlich)	21,2	18,6	21,6	17,4
weiblich	16,1	14,3	16,2	12,8
männlich	26,0	22,7	26,7	21,8

d) Konsumformen* von Jugendlichen 2008 (12 - 17 Jahre): pro Tag			
	alle	männlich	weiblich
abstinent	54,7	52,9	56,6
risikoarmer Konsum	37,1	38,0	36,1
riskanter Konsum	6,2	6,6	5,8
gefährlicher Konsum	2,0	2,5	1,5

*)

risikoarmer Konsum (Männer > 0 - 24 g, Frauen > 0 - 12 g)

riskanter Konsum (Männer > 2 - 60 g, Frauen > 12 - 40 g)

gefährlicher Hochkonsum (Männer > 60 g, Frauen > 40 g)

1.2.2 Häufigkeit des Konsums spirituosehaltiger Alcopops (12-17 Jahre) ³⁾

a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)				
	Erhebungsjahr			
	2004	2005	2007	2008
alle (weiblich + männlich)	28,4	15,6	10,4	9,8
weiblich	30,0	17,7	10,3	8,5
männlich	26,8	13,7	10,5	11,0

b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Mindestens 1x pro Monat (%)						
Erhebungsjahr	2004		2005		2007	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (weiblich + männlich)	20	46	10	26	6	18
weiblich	21	48	12	29	6	17
männlich	18	45	9	23	7	18

1.2.3 Häufigkeit des Konsums bier- und weinhaltiger Alcopops/Mischgetränke (12-17 Jahre) ³⁾

a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)			
	Erhebungsjahr		
	2004	2005	2007
alle (weiblich + männlich)	23	21	24
weiblich	22	18	21
männlich	25	24	27

b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: mindestens 1x pro Monat (%)						
Erhebungsjahr	2004		2005		2007	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (weiblich + männlich)	16	38	14	34	15	41
weiblich	17	33	13	28	14	35
männlich	16	42	16	41	16	46

**1.2.4 Konsum unterschiedlicher Alkoholika von Jugendlichen (12-17 Jahre)
Mindestens 1x pro Monat (%) im Jahr 2007 ³⁾**

	Altersgruppen		
	12-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
<u>Bier</u>			
alle (m + w)	37	21	64
weiblich	30	18	52
männlich	43	25	76
<u>Wein/Sekt</u>			
alle (m + w)	18	10	32
weiblich	22	12	39
männlich	14	9	25
<u>Spirituosen</u>			
alle (m + w)	21	9	43
weiblich	18	9	34
männlich	24	9	50
<u>Cocktails/Longdrinks</u>			
alle (m + w)	26	12	50
weiblich	27	14	50
männlich	25	11	50

1.2.5 Menge des konsumierten Alkohols (in g reiner Alkohol) pro Woche ³⁾

a) Gesamt (12-17 Jahre)

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr		
	2004	2005	2007
alle (m + w)	44,2	34,1	50,4
weiblich	27,5	19,8	28,7
männlich	59,7	47,2	71,1

b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr					
	2004		2005		2007	
	Altersgruppe		Altersgruppe		Altersgruppe	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (m + w)	20,9	92,2	13,5	76,1	21,1	104,6
weiblich	14,8	54,1	9,0	41,7	15,9	52,6
männlich	26,6	126,5	17,6	107,6	26,1	154,2

1.2.6 Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an 1 Tag (Binge-Trinken) im letzten Monat (%) ³⁾

a) Gesamt (12-17 Jahre)						
	Erhebungsjahr					
	2004	2005	2007	2008		
alle (m + w)	22,6	19,6	25,2	20,4		
weiblich	18,7	15,2	20,1	17,7		
männlich	26,3	23,8	30,7	23,0		

b) Altersgruppen 12-17 Jahre/16-17 Jahre						
Erhebungsjahr	2004		2005		2007	
Altersgruppe (Jahre)	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (m + w)	13	43	9	40	12	51
weiblich	12	33	7	31	11	37
männlich	14	52	11	48	13	63

1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen ⁴⁾

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000		
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700		
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten)		ca. 24,4 Mrd.		
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000		
Rehabilitationsmaßnahmen		40.000		
Frühberentungen		5.000		
Straftaten unter Alkoholeinfluss ⁴⁾ : 2007		alle	davon: mit Alkoholeinfluss	in %
Gefährliche oder schwere Körperverletzung		172.685	56.026	32,4
Vergewaltigung und sexuelle Nötigung		5.518	1.262	22,9
Totschlag und Tötung auf Verlangen		1.947	722	37,2
Sachbeschädigung		187.676	48.079	25,4

1.4 Dokumentierte Krankenhausbehandlungen (Akutbereich, 2004)

1. Alkohol F10 „Psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol“ (Anzahl)	290.864
2. Weitere Substanzen	
F11 Opioide	25.889
F12 Cannabioide	5.107
F13 Sedaktiva oder Hypnotika	8.504
F14 Kokain	1.096
F16 Halluzinogene	562
F18 Lösungsmittel	151
F19 Multiple Substanzen	41.699
F11 - F19	83.008
3. Gesamt (F10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19)	373.872

1.5 Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol): 2001-2007 ⁴⁾

	Erhebungsjahr						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
mit Personenschaden: (Anteil Frauen ca. 12 %)	25.690	25.333	24.245	22.548	22.004	20.685	21.072
dabei Getötete	909	932	817	704	603	599	565
häufigste Altersgruppen bei Unfällen mit Personenschäden	1) 21 - 24 Jahre (Männer) 2) 18 - 20 Jahre (Männer)						

1.6 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999 - 2006 ⁴⁾ in Litern

	Erhebungsjahr								
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bierkonsum	111,7	116,1	115,3	115,9	117,5	121,5	122,4	125,5	127,5
Weinkonsum	20,6	20,1	19,9	20,1	19,8	20,3	19,8	19,0	18,0
Schaumwein	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,2	4,1	4,9
Spirituosenkonsum	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,9
Pro-Kopf-Verbrauch Alkohol in Litern	141,6	145,6	144,6	145,5	147,0	151,6	152,8	154,4	156,3
Pro-Kopf-Verbrauch reiner Alkohol	9,9	10,1	10,0	10,1	10,2	10,4	10,4	10,5	10,6
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €	3.450 Mio. €	3.411 Mio. €	3.459 Mio. €	3.507 Mio. €	3.660 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €	525 Mio. €	560 Mio. €	575 Mio. €	597 Mio. €	555 Mio. €

1.7 Rangfolge ausgewählte Länder:

1.7.1 Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2003 ⁴⁾

1. Luxemburg	12,6
2. Ungarn	11,4
3. Tschechien	11,0
4. Irland	10,8
5. Deutschland	10,2
6. Spanien	10,0
7. Großbritannien	9,6
8. Portugal	9,6
9. Dänemark	9,5
10. Frankreich	9,3

1.7.2 Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2001 - 2003 im Alter von 15 Jahren und mehr (WHO 2008)

1. Luxemburg	15,2
2. Irland	13,7
3. Ungarn	13,4
4. Tschechien	12,9
5. Frankreich	12,3
6. Deutschland	12,2
7. Portugal	11,9
8. Dänemark	11,7
9. Spanien	11,5
10. Großbritannien	11,3

1.8 Werbeaufwendungen in Mio. € ⁴⁾

	Erhebungsjahr								
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bier	393	368	409	364	336	347	360	388	380
Spirituosen	104	77	87	97	118	132	134	125	110
Sekt	46	48	47	45	48	54	46	54	42
Wein	14	17	21	20	24	27	35	31	21
Gesamt	557	510	564	526	525	560	575	597	555

1.9 Alkoholsteuern in Mio. € ⁴⁾

	Erhebungsjahr								
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Biersteuer	757	778	777	787	786	812	828	844	846
Schaum- weinsteuer	371	421	424	436	432	420	457	478	546
Branntwein- steuer	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232	2.149	2.143	2.151	2.233
Gesamt	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450	3.381	3.428	3.472	3.625

2. Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe ⁴⁾

Art der Einrichtung	Anzahl	Plätze
Beratungsstellen und -dienste (pro Jahr) ca.	<1.000	275.000 Hilfesuchende
Ambulante Behandlungseinrichtungen, anerkannt	465	10.814
Substitutionsbehandlung mit psychosozialer Betreuung (registriert)		64.500
Niedrigschwellige Angebote	471	
Entzug mit Motivationsanteilen	204	6.762
→ davon für Drogenabhängige	83	1.784
Vollstationäre Entwöhnungsplätze		11.312
→ davon für Drogenabhängige		3.931
Adaptionseinrichtungen	81	983
Betreutes Wohnen	277	7.599
→ davon für Drogenabhängige	79	2.762
Einrichtungen für chronisch Mehrfachbeeinträchtigte	196	7.511
Tages- und Nachtambulanz		506
Arbeitsprojekte/Qualifizierungsmaßnahmen	124	1.787
Selbsthilfegruppen	> 10.000	150.000

Quelle: Länderkurzberichte über die Situation im Suchtbereich 1998 bis 2004 und Fortschreibungen durch J. Leune

Literaturquellen:

- 1) Kraus, L.. Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Alkoholkonsum der Jugendlichen in Deutschland 2004 bis 2007, Kurzbericht Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 09, ISBN 978-87581-290-9, Geesthacht 2009

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.