

# Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten (2011)

## 1 Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit

### 1.1 Erwachsene Bevölkerung (18 - 64 Jahre) <sup>1a)</sup> (Gesamt: 51,6 Mio.)

**N: 8.030, Ausschöpfungsquote 50,1 %**

Konsumform: Alkohol im Jahr 2009 (letzte 30 Tage)

	2009				Gesamt
	Männer (M)		Frauen (F)		
Abstinenz (letzte 30 Tage)	-	9,2 %	-	17,9 %	13,4 %
risikoarmer Konsum	0 - 24 g	64,0 %	0 - 12 g	55,7 %	59,9 %
riskanter Konsum	> 24 g	18,5 %	> 12 g	14,3 %	16,5 % (8,5 Mio.)

Anteil mit problematischem Alkoholkonsum (AUDIT, 12 Monate)	Männer (M)		Frauen (F)		Gesamt
Gesamtstichprobe	29,7 %		7,9 %		19,0 % (9,8 Mio.)
Konsumenten	32,4 %		8,9 %		21,1 %

Anteil nach Altersgruppen (Jahre)	18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
(Konsumenten) in %	43,6	37,6	32,6	20,7	15,1	15,4	12,8

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

### Prävalenz des Rauschtrinkens (letzte 30 Tage) (%)

(5 oder mehr Gläser Alkohol) 2009 <sup>1a)</sup>

Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	66,1	53,4	81,5
1-3 mal	21,4	28,4	12,9
4 mal und mehr	12,5	18,2	5,6

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 18-20-Jährige (24,9 %), gefolgt von den 21-24-Jährigen (21,3 %) statt.

### Alkoholabhängigkeit/-missbraucher 2006 (DSM IV) <sup>1b)</sup>

	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	2,4 % (1,2 Mio.)	3,4	1,4
Anteil Alkoholmissbraucher	3,8 % (1,9 Mio.)	6,4	1,2

<b>Trends für Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit nach DSM IV bei 18-59-jährigen 1997-2006 <sup>1b)</sup>(%)</b>			
	<b>Erhebungsjahr</b>		
	<b>1997</b>	<b>2000</b>	<b>2006</b>
<b>Gesamt</b>			
DSM IV Missbrauch	3,4		3,9
DSM IV Abhängigkeit	2,6	2,9	2,6
<b>Männer</b>			
DSM IV Missbrauch	5,4		6,5
DSM IV Abhängigkeit	4,2	4,5	3,6
<b>Frauen</b>			
DSM IV Missbrauch	1,5		1,2
DSM IV Abhängigkeit	1,0	1,2	1,5

ca. 400.000 ältere Menschen über 60 Jahre (2-3% Männer, 1% Frauen) weisen einen Alkoholmissbrauch oder eine -abhängigkeit auf

## 1.2 **Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004 - 2008: 12-17 Jahre** (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)<sup>3)</sup>

### 1.2.1 **Alkoholkonsum Jugendlicher (12-17 Jahre)<sup>3)</sup>**

#### a) **Gesamt : Konsum mindestens 1x im letzten Monat (%) 2008**

	<b>Erhebungsjahr 2008</b>		
	<b>12-25 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>
alle (weiblich + männlich)	65,8	76,2	28,6
weiblich	61,0	73,0	31,1
männlich	70,4	79,2	26,2

#### b) **Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Konsum mindestens 1x im letzten Monat (%) 2004-2008**

<b>Erhebungsjahr</b>	<b>2004</b>		<b>2007</b>		<b>2008</b>	
	<b>12-15</b>	<b>16-17</b>	<b>12-15</b>	<b>16-17</b>	<b>12-15</b>	<b>16-17</b>
alle (weiblich + männlich)	46,4	83,3	40,2	85,1	28,6	76,2
weiblich	47,6	80,6	41,1	82,6	31,1	73,0
männlich	45,2	86,0	39,4	87,4	26,2	79,2

#### c) **Altersgruppe (12-17 Jahre): Wöchentlicher (regelmäßiger) Alkoholkonsum (mindestens 1x) 2004-2008**

<b>Jahr</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
alle (weiblich + männlich)	21,2	18,6	21,6	17,4
weiblich	16,1	14,3	16,2	12,8
männlich	26,0	22,7	26,7	21,8

#### d) **Altersgruppe (12-17 Jahre): Wöchentlicher (regelmäßiger) Alkoholkonsum 2008**

<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-15</b>	<b>16-17</b>
alle (weiblich + männlich)	6,4	36,0
weiblich	6,0	24,4
männlich	6,8	47,1

## 1.2.2 Häufigkeit des Konsums spirituosehaltiger Alcopops (12-17 Jahre)<sup>3)</sup> 2004-2008

### a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)

	Erhebungsjahr			
	2004	2005	2007	2008
alle (weiblich + männlich)	28,4	15,6	10,4	9,8
weiblich	30,0	17,7	10,3	8,5
männlich	26,8	13,7	10,5	11,0

### b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Mindestens 1x pro Monat (% , gerundet)

Erhebungsjahr	2004		2005		2007		2008	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (weiblich + männlich)	20	46	10	26	7	18	3	21
weiblich	21	48	12	29	6	17	3	17
männlich	18	45	9	23	7	18	3	25

## 1.2.3 Häufigkeit des Konsums bier- und weinhaltiger Alcopops/Mischgetränke (12-17 Jahre)<sup>3)</sup> 2004-2008

### a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)

	Erhebungsjahr			
	2004	2005	2007	2008
alle (weiblich + männlich)	23	21	24	26
weiblich	22	18	21	
männlich	25	24	27	

### b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: mindestens 1x pro Monat (% , gerundet)

Erhebungsjahr	2004		2005		2007		2008	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (weiblich + männlich)	16	38	14	34	15	41	15	46
weiblich	17	33	13	28	14	35	14	40
männlich	16	42	16	41	16	46	15	52

**1.2.4 Konsum unterschiedlicher Alkoholika von Jugendlichen (12-25 Jahre)  
Mindestens 1x pro Monat (%) im Jahr 2008 <sup>3)</sup>**

	Altersgruppen		
	12-25 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
<b><u>Bier</u></b>			
alle (m + w)	36,2	20,4	63,0
weiblich	30,4	18,8	50,1
männlich	41,8	22,0	75,3
<b><u>Wein/Sekt</u></b>			
alle (m + w)	29,9	8,8	26,8
weiblich	35,0	10,1	29,8
männlich	25,1	7,6	23,9
<b><u>Spirituosen</u></b>			
alle (m + w)	25,2	6,1	30,7
weiblich	19,2	6,2	24,4
männlich	31,0	6,0	36,7
<b><u>Cocktails/Longdrinks</u></b>			
alle (m + w)	39,8	10,4	46,0
weiblich	37,8	12,8	43,9
männlich	41,8	8,1	47,9
<b><u>Bier/weinhaltige Getränke</u></b>			
alle (m + w)	26,1	14,5	45,8
weiblich	22,6	14,4	39,4
männlich	29,4	14,6	51,8
<b><u>Spirituosehaltige Alcopops</u></b>			
alle (m + w)	11,7	3,1	21,1
weiblich	10,3	3,4	17,3
männlich	13,1	2,9	24,8

**1.2.5 Menge des konsumierten Alkohols (in g reiner Alkohol) pro Woche <sup>3)</sup> 2004-2008**

**a) Gesamt (12-17 Jahre) (%)**

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr			
	2004	2005	2007	2008
alle (m + w)	44,2	34,1	50,4	42,1
weiblich	27,5	19,8	28,7	
männlich	59,7	47,2	71,1	

**b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre (%)**

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr							
	2004		2005		2007		2008	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (m + w)	20,9	92,2	13,5	76,1	21,1	104,6	15,3	89,1
weiblich	14,8	54,1	9,0	41,7	15,9	52,6	11,6	46,3
männlich	26,6	126,5	17,6	107,6	26,1	154,2	18,8	128,7

<b>c) Konsumierte Alkoholmenge nach Risikobewertung 12-17 Jahre (2008) in Gramm pro Tag <sup>5)</sup></b>				
	<b>abstinent</b>	<b>Risikoarmer Konsum</b>	<b>Riskanter Konsum</b>	<b>Gefährlicher/Hochkonsum</b>
alle (m + w)	54,7	37,1	6,2	2,0
weiblich	56,6	36,1	5,8	1,5
männlich	52,9	38,0	6,6	2,5

Riskanter Konsum für Erwachsene: 24-60 g/Tag M, 12-40 g F

Gefährlicher Konsum für Erwachsene: >60 g/Tag M, >40 g F

Fazit:

6,2 % der 12-17-Jährigen konsumieren eine selbst für Erwachsene riskante Alkoholmenge, 2,0 % weisen einen für Erwachsene gefährlichen Konsum auf.

## **1.2.6 Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an 1 Tag (Binge-Trinken) im letzten Monat (% , gerundet) <sup>3)</sup>**

<b>a) Gesamt (12-17 Jahre): Binge-Trinken 2004-2008</b>				
	<b>Erhebungsjahr</b>			
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
alle (m + w)	23	20	26	20
weiblich	19	15	20	18
männlich	26	24	31	23

<b>Wöchentliches Binge-Trinken (2008) (%) 12-17 Jahre</b>	
<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-17</b>
alle (weiblich + männlich)	5,8
weiblich	4,0
männlich	7,6

<b>Alkoholrausch in letzten 30 Tagen (2008) (%) 12-17 Jahre</b>	
<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-17</b>
alle (weiblich + männlich)	8,3
weiblich	6,7
männlich	9,9

<b>b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Binge-Trinken 2004-2008</b>						
<b>Erhebungsjahr</b>	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2007</b>	
	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>
alle (m + w)	13	43	9	40	12	51
weiblich	12	33	7	31	11	37
männlich	14	52	11	48	13	63

<b>c) Alkoholkonsum nach Schulformen 12-17 Jahre (2008)</b>				
	<b>Hauptschule Sek I</b>	<b>Realschule Sek I</b>	<b>Gesamtschule Sek I</b>	<b>Gymnasium Sek I</b>
30-Tage-Prävalenz	39,4	43,6	31,1	36,1
Regelmäßiger Konsum	13,5	15,9	13,8	7,1
Binge-Trinken (30 Tage)	19,5	18,7	11,4	10,9
Binge-Trinken (wöchentlich)	6,2	5,3	3,8	2,3
Alkoholrausch (30 Tage)	10,1	7,1	9,4	4,7

### **1.2.7 Alkoholvergiftungen von Kindern und Jugendlichen (10-20 Jahre) Krankenhausfälle (Pressemitteilung BMG 15.12.2009)**

<b>Jahr</b>	<b>2000</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Zunahme 2000-2008 (%)</b>
Anzahl	9.500	17.931	23.165	25.700	170

### **1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen <sup>4)</sup>**

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000		
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700		
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten)		ca. 24,4 Mrd.		
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000		
Rehabilitationsmaßnahmen		40.000		
Frühberentungen		5.000		
Straftaten unter Alkoholeinfluss <sup>4)</sup> : 2008		alle	davon: mit Alkoholeinfluss	in %
Gewaltkriminalität gesamt		208.293	65.159	31,3
davon:				
- Gefährliche oder schwere Körperverletzung		171.325	57.102	33,3
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung		6.364	1.889	29,7
- Totschlag und Tötung auf Verlangen		1.973	752	38,1
Sachbeschädigung		185.125	50.284	27,2
Alle Tatverdächtigen		2.255.693	274.867	12,2

## 1.4 Dokumentierte Krankenhausbehandlungen (Akutbereich, 2004)

1. Alkohol F10 „Psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol“ (Anzahl)	290.864
2. Weitere Substanzen	
F11 Opioide	25.889
F12 Cannabioide	5.107
F13 Sedaktiva oder Hypnotika	8.504
F14 Kokain	1.096
F16 Halluzinogene	562
F18 Lösungsmittel	151
F19 Multiple Substanzen	41.699
F11 - F19	83.008
3. Gesamt (F10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19)	373.872

## 1.5 Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol): 2001-2008 <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
mit Personenschaden: (Anteil Frauen ca. 12 %)	25.690	25.333	24.245	22.548	22.004	20.685	20.785	19.603
dabei Getötete	909	932	817	704	603	599	565	523
Häufigste Altersgruppen bei Unfällen mit Personenschäden	21 - 24 Jahre (Männer)							
Häufigste Wochentage	Samstag 24,0 % Sonntag 22,5 %							

## 1.6 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999 - 2006 <sup>4)</sup> in Litern

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bierkonsum	111,1	111,8	116,1	115,3	115,9	117,5	121,5	122,4	125,5	127,5
Weinkonsum	20,7	20,6	20,1	19,9	20,1	19,8	20,3	19,8	19,0	18,0
Schaumwein	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,2	4,1	4,9
Spirituosenkonsum	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,9
Pro-Kopf-Verbrauch Alkohol in Litern	141,2	141,6	145,6	144,6	145,5	147,0	151,6	152,8	154,4	156,3
Pro-Kopf-Verbrauch reiner Alkohol	9,9	9,9	10,1	10,0	10,1	10,2	10,4	10,4	10,5	10,6
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3.325 Mio. €	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €	3.450 Mio. €	3.411 Mio. €	3.459 Mio. €	3.507 Mio. €	3.660 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	552 Mio. €	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €	525 Mio. €	560 Mio. €	575 Mio. €	597 Mio. €	555 Mio. €

## 1.7 Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2003 im Alter von 15 Jahren und mehr (WHO 2009) <sup>4)</sup>

1. Luxemburg	15,6
2. Irland	13,7
3. Ungarn	13,6
4. Tschechien	13,0
5. Deutschland	12,0
6. Großbritannien	11,8
7. Spanien	11,7
8. Portugal	11,5
9. Zypern	11,5
10. Frankreich	11,4
11. Österreich	11,1

## 1.8 Werbeaufwendungen in Mio. € <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bier	399	393	368	409	364	336	347	360	388	380
Spirituosen	102	104	77	87	97	118	132	134	125	110
Sekt	38	46	48	47	45	48	54	46	54	42
Wein	13	14	17	21	20	24	27	35	31	21
Gesamt	552	557	510	564	526	525	560	575	597	555

## 1.9 Alkoholsteuern in Mio. € <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Biersteuer	739	757	778	777	787	786	812	828	844	846
Schaum- weinsteuer	430	371	421	424	436	432	420	457	478	546
Branntwein- steuer	2.156	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232	2.149	2.143	2.151	2.233
Gesamt	3.325	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450	3.381	3.428	3.472	3.625

## Literaturquellen:

- 1a) Kraus, L., Pabst, A: Der Epidemiologische Suchtsurvey 2009, Sucht, 56. Jahrgang, Heft 5, Oktober 2010
- 1b) Kraus, L.: Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Verbreitung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Juni 2009
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 10, ISBN 978-87581-310-4, Geesthacht 2010
- 5) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008 - Verbreitung des Tabakkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Mai 2009,
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Förderung des Nichtrauchens, Juli 2006
- 7) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 8) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Cannabiskonsum der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, Kurzbericht, Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 9) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Drogen- und Suchtbericht Mai 2007, Berlin  
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2003
- 10) Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland, Sucht, 43. Jahrgang, Sonderheft 2, Dezember 1997

---

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.