

# Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten (2011)

## 1 Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit

### 1.1 Erwachsene Bevölkerung (18 - 64 Jahre) <sup>1a)</sup> (Gesamt: 51,6 Mio.)

**N: 8.030, Ausschöpfungsquote 50,1 %**

Konsumform: Alkohol im Jahr 2009 (letzte 30 Tage)

	2009				Gesamt
	Männer (M)		Frauen (F)		
Abstinenz (letzte 30 Tage)	-	9,2 %	-	17,9 %	13,4 %
risikoarmer Konsum	0 - 24 g	64,0 %	0 - 12 g	55,7 %	59,9 %
riskanter Konsum	> 24 g	18,5 %	> 12 g	14,3 %	16,5 % (8,5 Mio.)

Anteil mit problematischem Alkoholkonsum (AUDIT, 12 Monate)	Männer (M)		Frauen (F)		Gesamt
Gesamtstichprobe	29,7 %		7,9 %		19,0 % (9,8 Mio.)
Konsumenten	32,4 %		8,9 %		21,1 %

Anteil nach Altersgruppen (Jahre)	18-20	21-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-64
(Konsumenten) in %	43,6	37,6	32,6	20,7	15,1	15,4	12,8

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

### Prävalenz des Rauschtrinkens (letzte 30 Tage) (%)

(5 oder mehr Gläser Alkohol) 2009 <sup>1a)</sup>

Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	66,1	53,4	81,5
1-3 mal	21,4	28,4	12,9
4 mal und mehr	12,5	18,2	5,6

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 18-20-Jährige (24,9 %), gefolgt von den 21-24-Jährigen (21,3 %) statt.

### Alkoholabhängigkeit/-missbraucher 2006 (DSM IV) <sup>1b)</sup>

	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	2,4 % (1,2 Mio.)	3,4	1,4
Anteil Alkoholmissbraucher	3,8 % (1,9 Mio.)	6,4	1,2

**Trends für Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit nach DSM IV bei 18-59-jährigen 1997-2006 <sup>1b)</sup>(%)**

	Erhebungsjahr		
	1997	2000	2006
<b>Gesamt</b>			
DSM IV Missbrauch	3,4		3,9
DSM IV Abhängigkeit	2,6	2,9	2,6
<b>Männer</b>			
DSM IV Missbrauch	5,4		6,5
DSM IV Abhängigkeit	4,2	4,5	3,6
<b>Frauen</b>			
DSM IV Missbrauch	1,5		1,2
DSM IV Abhängigkeit	1,0	1,2	1,5

ca. 400.000 ältere Menschen über 60 Jahre (2-3% Männer, 1% Frauen) weisen einen Alkoholmissbrauch oder eine -abhängigkeit auf

## 1.2 Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004 - 2008: 12-17 Jahre (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)<sup>3)</sup>

### 1.2.1 Alkoholkonsum Jugendlicher (12-17 Jahre)<sup>3)</sup>

#### a) Gesamt : Konsum mindestens 1x im letzten Monat (%) 2008

	Erhebungsjahr 2008		
	12-25 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre
alle (weiblich + männlich)	65,8	76,2	28,6
weiblich	61,0	73,0	31,1
männlich	70,4	79,2	26,2

#### b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Konsum mindestens 1x im letzten Monat (%) 2004-2008

Erhebungsjahr	2004		2007		2008	
	12-15	16-17	12-15	16-17	12-15	16-17
alle (weiblich + männlich)	46,4	83,3	40,2	85,1	28,6	76,2
weiblich	47,6	80,6	41,1	82,6	31,1	73,0
männlich	45,2	86,0	39,4	87,4	26,2	79,2

#### c) Altersgruppe (12-17 Jahre): Wöchentlicher (regelmäßiger) Alkoholkonsum (mindestens 1x) 2004-2008

Jahr	2004	2005	2007	2008
alle (weiblich + männlich)	21,2	18,6	21,6	17,4
weiblich	16,1	14,3	16,2	12,8
männlich	26,0	22,7	26,7	21,8

#### d) Altersgruppe (12-17 Jahre): Wöchentlicher (regelmäßiger) Alkoholkonsum 2008

Altersgruppe (Jahre)	12-15	16-17
alle (weiblich + männlich)	6,4	36,0
weiblich	6,0	24,4
männlich	6,8	47,1

## 1.2.2 Häufigkeit des Konsums spirituosehaltiger Alcopops (12-17 Jahre)<sup>3)</sup> 2004-2008

<b>a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)</b>				
	<b>Erhebungsjahr</b>			
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
alle (weiblich + männlich)	28,4	15,6	10,4	9,8
weiblich	30,0	17,7	10,3	8,5
männlich	26,8	13,7	10,5	11,0

<b>b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Mindestens 1x pro Monat (% , gerundet)</b>								
<b>Erhebungsjahr</b>	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2007</b>		<b>2008</b>	
<b>Altergruppe</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>
alle (weiblich + männlich)	20	46	10	26	7	18	3	21
weiblich	21	48	12	29	6	17	3	17
männlich	18	45	9	23	7	18	3	25

## 1.2.3 Häufigkeit des Konsums bier- und weinhaltiger Alcopops/Mischgetränke (12-17 Jahre)<sup>3)</sup> 2004-2008

<b>a) Gesamt (12-17 Jahre): mindestens 1x pro Monat (%)</b>				
	<b>Erhebungsjahr</b>			
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
alle (weiblich + männlich)	23	21	24	26
weiblich	22	18	21	
männlich	25	24	27	

<b>b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: mindestens 1x pro Monat (% , gerundet)</b>								
<b>Erhebungsjahr</b>	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2007</b>		<b>2008</b>	
<b>Altergruppe</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>
alle (weiblich + männlich)	16	38	14	34	15	41	15	46
weiblich	17	33	13	28	14	35	14	40
männlich	16	42	16	41	16	46	15	52

**1.2.4 Konsum unterschiedlicher Alkoholika von Jugendlichen (12-25 Jahre)  
Mindestens 1x pro Monat (%) im Jahr 2008 <sup>3)</sup>**

	Altersgruppen		
	12-25 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
<b><u>Bier</u></b>			
alle (m + w)	36,2	20,4	63,0
weiblich	30,4	18,8	50,1
männlich	41,8	22,0	75,3
<b><u>Wein/Sekt</u></b>			
alle (m + w)	29,9	8,8	26,8
weiblich	35,0	10,1	29,8
männlich	25,1	7,6	23,9
<b><u>Spirituosen</u></b>			
alle (m + w)	25,2	6,1	30,7
weiblich	19,2	6,2	24,4
männlich	31,0	6,0	36,7
<b><u>Cocktails/Longdrinks</u></b>			
alle (m + w)	39,8	10,4	46,0
weiblich	37,8	12,8	43,9
männlich	41,8	8,1	47,9
<b><u>Bier/weinhaltige Getränke</u></b>			
alle (m + w)	26,1	14,5	45,8
weiblich	22,6	14,4	39,4
männlich	29,4	14,6	51,8
<b><u>Spirituosehaltige Alcopops</u></b>			
alle (m + w)	11,7	3,1	21,1
weiblich	10,3	3,4	17,3
männlich	13,1	2,9	24,8

**1.2.5 Menge des konsumierten Alkohols (in g reiner Alkohol) pro Woche <sup>3)</sup> 2004-2008**

**a) Gesamt (12-17 Jahre) (%)**

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr			
	2004	2005	2007	2008
alle (m + w)	44,2	34,1	50,4	42,1
weiblich	27,5	19,8	28,7	
männlich	59,7	47,2	71,1	

**b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre (%)**

Gesamtalkohol	Erhebungsjahr							
	2004		2005		2007		2008	
	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre	12-15 Jahre	16-17 Jahre
alle (m + w)	20,9	92,2	13,5	76,1	21,1	104,6	15,3	89,1
weiblich	14,8	54,1	9,0	41,7	15,9	52,6	11,6	46,3
männlich	26,6	126,5	17,6	107,6	26,1	154,2	18,8	128,7

<b>c) Konsumierte Alkoholmenge nach Risikobewertung 12-17 Jahre (2008) in Gramm pro Tag <sup>5)</sup></b>				
	<b>abstinent</b>	<b>Risikoarmer Konsum</b>	<b>Riskanter Konsum</b>	<b>Gefährlicher/Hochkonsum</b>
alle (m + w)	54,7	37,1	6,2	2,0
weiblich	56,6	36,1	5,8	1,5
männlich	52,9	38,0	6,6	2,5

Riskanter Konsum für Erwachsene: 24-60 g/Tag M, 12-40 g F

Gefährlicher Konsum für Erwachsene: >60 g/Tag M, >40 g F

Fazit:

6,2 % der 12-17-Jährigen konsumieren eine selbst für Erwachsene riskante Alkoholmenge, 2,0 % weisen einen für Erwachsene gefährlichen Konsum auf.

## **1.2.6 Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an 1 Tag (Binge-Trinken) im letzten Monat (% , gerundet) <sup>3)</sup>**

<b>a) Gesamt (12-17 Jahre): Binge-Trinken 2004-2008</b>				
	<b>Erhebungsjahr</b>			
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
alle (m + w)	23	20	26	20
weiblich	19	15	20	18
männlich	26	24	31	23

<b>Wöchentliches Binge-Trinken (2008) (%) 12-17 Jahre</b>	
<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-17</b>
alle (weiblich + männlich)	5,8
weiblich	4,0
männlich	7,6

<b>Alkoholrausch in letzten 30 Tagen (2008) (%) 12-17 Jahre</b>	
<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-17</b>
alle (weiblich + männlich)	8,3
weiblich	6,7
männlich	9,9

<b>b) Altersgruppen 12-15 Jahre/16-17 Jahre: Binge-Trinken 2004-2008</b>						
<b>Erhebungsjahr</b>	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2007</b>	
<b>Altersgruppe (Jahre)</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>	<b>12-15 Jahre</b>	<b>16-17 Jahre</b>
alle (m + w)	13	43	9	40	12	51
weiblich	12	33	7	31	11	37
männlich	14	52	11	48	13	63

<b>c) Alkoholkonsum nach Schulformen 12-17 Jahre (2008)</b>				
	<b>Hauptschule Sek I</b>	<b>Realschule Sek I</b>	<b>Gesamtschule Sek I</b>	<b>Gymnasium Sek I</b>
30-Tage-Prävalenz	39,4	43,6	31,1	36,1
Regelmäßiger Konsum	13,5	15,9	13,8	7,1
Binge-Trinken (30 Tage)	19,5	18,7	11,4	10,9
Binge-Trinken (wöchentlich)	6,2	5,3	3,8	2,3
Alkoholrausch (30 Tage)	10,1	7,1	9,4	4,7

### **1.2.7 Alkoholvergiftungen von Kindern und Jugendlichen (10-20 Jahre) Krankenhausfälle (Pressemitteilung BMG 15.12.2009)**

<b>Jahr</b>	<b>2000</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Zunahme 2000-2008 (%)</b>
Anzahl	9.500	17.931	23.165	25.700	170

### **1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen <sup>4)</sup>**

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000		
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700		
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten)		ca. 24,4 Mrd.		
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000		
Rehabilitationsmaßnahmen		40.000		
Frühberentungen		5.000		
Straftaten unter Alkoholeinfluss <sup>4)</sup> : 2008		alle	davon: mit Alkoholeinfluss	in %
Gewaltkriminalität gesamt		208.293	65.159	31,3
davon:				
- Gefährliche oder schwere Körperverletzung		171.325	57.102	33,3
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung		6.364	1.889	29,7
- Totschlag und Tötung auf Verlangen		1.973	752	38,1
Sachbeschädigung		185.125	50.284	27,2
Alle Tatverdächtigen		2.255.693	274.867	12,2

## 1.4 Dokumentierte Krankenhausbehandlungen (Akutbereich, 2004)

1. Alkohol F10 „Psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol“ (Anzahl)	290.864
2. Weitere Substanzen	
F11 Opioide	25.889
F12 Cannabioide	5.107
F13 Sedativa oder Hypnotika	8.504
F14 Kokain	1.096
F16 Halluzinogene	562
F18 Lösungsmittel	151
F19 Multiple Substanzen	41.699
F11 - F19	83.008
3. Gesamt (F10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19)	373.872

## 1.5 Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol): 2001-2008 <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
mit Personenschaden: (Anteil Frauen ca. 12 %)	25.690	25.333	24.245	22.548	22.004	20.685	20.785	19.603
dabei Getötete	909	932	817	704	603	599	565	523
Häufigste Altersgruppen bei Unfällen mit Personenschäden	21 - 24 Jahre (Männer)							
Häufigste Wochentage	Samstag 24,0 % Sonntag 22,5 %							

## 1.6 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999 - 2006 <sup>4)</sup> in Litern

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bierkonsum	111,1	111,8	116,1	115,3	115,9	117,5	121,5	122,4	125,5	127,5
Weinkonsum	20,7	20,6	20,1	19,9	20,1	19,8	20,3	19,8	19,0	18,0
Schaumwein	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,2	4,1	4,9
Spirituosen- konsum	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,9
Pro-Kopf- Verbrauch Alkohol in Litern	141,2	141,6	145,6	144,6	145,5	147,0	151,6	152,8	154,4	156,3
Pro-Kopf- Verbrauch reiner Alkohol	9,9	9,9	10,1	10,0	10,1	10,2	10,4	10,4	10,5	10,6
Einnahmen an alkohol- bezogenen Steuern	3.325 Mio. €	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €	3.450 Mio. €	3.411 Mio. €	3.459 Mio. €	3.507 Mio. €	3.660 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	552 Mio. €	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €	525 Mio. €	560 Mio. €	575 Mio. €	597 Mio. €	555 Mio. €

## 1.7 Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2003 im Alter von 15 Jahren und mehr (WHO 2009) <sup>4)</sup>

1. Luxemburg	15,6
2. Irland	13,7
3. Ungarn	13,6
4. Tschechien	13,0
5. Deutschland	12,0
6. Großbritannien	11,8
7. Spanien	11,7
8. Portugal	11,5
9. Zypern	11,5
10. Frankreich	11,4
11. Österreich	11,1

## 1.8 Werbeaufwendungen in Mio. € <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bier	399	393	368	409	364	336	347	360	388	380
Spirituosen	102	104	77	87	97	118	132	134	125	110
Sekt	38	46	48	47	45	48	54	46	54	42
Wein	13	14	17	21	20	24	27	35	31	21
Gesamt	552	557	510	564	526	525	560	575	597	555

## 1.9 Alkoholsteuern in Mio. € <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Biersteuer	739	757	778	777	787	786	812	828	844	846
Schaum- weinsteuer	430	371	421	424	436	432	420	457	478	546
Branntwein- steuer	2.156	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232	2.149	2.143	2.151	2.233
Gesamt	3.325	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450	3.381	3.428	3.472	3.625

## 2. Tabakkonsum

Zigarettenkonsum (in Stück) <sup>4)</sup> , in Klammern Verhältnis zum Vorjahr (%)								
Erhebungsjahr								
2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
87,9 Mrd. (- 3,8 %)	91,5 Mrd. (- 2,1 %)	93,4 Mrd. (- 2,5 %)	95,8 Mrd. (- 14,3 %)	111,7 Mrd. (- 15,8 %)	ca. 132,6 Mrd.	ca. 142,5 Mrd.	ca. 142,5 Mrd.	ca. 139,6 Mrd.

Feinschnitt (in t) <sup>4)</sup>								
Erhebungsjahr								
2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
21.849 (- 2,4 %)	22.381 (- 1,4 %)	22.762 (- 31,7 %)	33.232 (+ 37,0 %)	24.265 (+ 30,4 %)	18.603 (+ 20,2 %)	15.473 (- 4,9 %)	16.273 (+ 11,4 %)	14.611 (+ 4,4 %)

Pfeifentabak (in t) <sup>4)</sup>								
Erhebungsjahr								
2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
1.883 (+ 17,0 %)	1.608 (+ 74,5 %)	922 (+ 14,7 %)	804 (- 9,1 %)	884 (+ 1,6 %)	870 (+ 2,7 %)	847 (- 8,4 %)	925 (+ 1,7 %)	909 (- 7,5 %)

Einnahmen Tabaksteuern 2000 - 2007 (Mio. €) <sup>4)</sup> (Netto)									
	Erhebungsjahr								
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Zigaretten	12.261	12.862	12.974	12.387	12.540	13.353	13.205	11.432	10.886
Zigarillos/ Zigarren	86	111	83	65	56	45	46	39	37
Feinschnitt	1.167	1.232	1.291	1.772	1.007	676	514	570	489
Pfeifentabak	50	43	26	24	23	21	21	22	23
Gesamt	13.563	14.248	14.375	14.247	13.626	14.095	13.771	12.063	11.436

Ausgaben für Tabak 1999 - 2007 (Mio. €) <sup>4)</sup>										
	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Zigaretten	19.425	19.992	19.913	19.533	19.961	21.078	21.578	19.861	19.176	19.579
Zigarillos/ Zigarren	720	823	783	664	653	569	566	499	507	469
Feinschnitt	2.170	2.162	2.339	3.708	2.217	1.472	1.058	1.140	990	923
Pfeifentabak	145	132	95	85	94	91	86	95	92	98
Gesamt	22.460	23.110	23.130	23.989	22.925	23.209	23.285	21.595	20.765	21.069

<b>Ausgaben der Tabakindustrie für Werbung, Promotion und Sponsoring <sup>1)</sup></b>		
	<b>2007 in €</b>	<b>Vergleich zum Vorjahr</b>
Gesamt	128,9 Mio.	+ 61,4 %
davon:		
- Werbung in Printmedien	0,46 Mio.	- 94,9 %
- Außenwerbung	49,2 Mio.	+ 145,7 %
- Werbung im Kino	2,1 Mio.	- 4,0 %
- Werbung im Internet	0,3 Mio.	- 89,3 %
- Sonstige Werbung	1,1 Mio.	+ 54,8 %
- Promotion	72,6 Mio.	+ 73,2 %
- Sponsorship	3,2 Mio.	- 13,1 %

<sup>1)</sup> *Tabakwerberichtlinie der EU: Anfang 2007 Werbeverbot für Tabakerzeugnisse in Hörfunk und Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Internet. Auch Sponsoring von Veranstaltungen mit grenzüberschreitender Wirkung (z.B. Formel-1-Rennen) ist untersagt. Weiterhin möglich ist z.B. Kino-, Plakatwerbung, Sponsoring regionaler Veranstaltungen.*

<b>Tabakbedingte Todesfälle (nach R. Peto 1994) <sup>4)</sup></b>		
<b>Gesamt</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>
110.000 - 140.000	95.000	16.200

<b>Kosten tabakbedingter Krankheiten und Todesfälle 2003 (Neubauer et al.) <sup>4)</sup></b>
21 Mrd. €

<b>Todesursachen</b>	
Krebs	43.000
Kreislaufkrankungen	37.000
Atemwegserkrankungen	20.000
Passivrauchen	3.300

## **2.1 Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre**

<b>Anteil der Raucher und Konsumfrequenz (18-64 J, 2009) <sup>1a)</sup></b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>
Raucher	29,2 % (15,07 Mio.)	32,8 %	25,5 %
Konsumfrequenz der Raucher (letzte 30 Tage)			
Nicht täglich	29,6 %	28,4 %	31,0 %
Täglich bis 10	21,7 %	17,4 %	27,1 %
Täglich 11-19	23,5 %	25,7 %	20,9 %
Täglich 20 und mehr	25,2 %	28,5 %	21,1 %

## 2.2 Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher (2009): 18-64 Jahre (%) <sup>1a)</sup>

		Altersgruppe						
		18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
<b>Gesamt</b>								
Nichtraucher	44,8	67,9	51,7	45,5	46,4	42,2	38,0	45,4
Exraucher	26,0	4,9	9,8	15,5	22,8	28,7	36,2	38,2
Raucher	29,2 (15,07 Mio.)	27,3	38,5	39,0	30,8	29,1	25,8	16,4
<b>Männer</b>								
Nichtraucher	38,8							
Exraucher	28,5							
Raucher	32,8							
<b>Frauen</b>								
Nichtraucher	51,0							
Exraucher	23,6							
Raucher	25,5							

### Anteil der Personen mit einem positiven Befund für Nikotinabhängigkeit nach DSM IV (%) (2009) (Gesamtstichprobe und Raucher der letzten 30 Tage) <sup>1a)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamt- stichprobe DSM IV Abhängigkeit	6,3 (3,35 Mio.)	6,8	5,8	7,9	8,6	9,7	6,9	5,8	5,3	2,4
Raucher DSM IV Abhängigkeit	19,9	19,2	20,9	26,6	19,9	22,8	20,1	18,7	18,8	14,9

### GEDA (Gesundheit in Deutschland aktuell) - Studie des Robert Koch Instituts (2009) erbrachte folgende Ergebnisse (Alter 18+ Jahre) in % <sup>4)</sup>

	Altersgruppe							
	Gesamt	18-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-69 Jahre	70-79 Jahre	80+ Jahre
Raucher	29,9							
Männer	33,9	43,2	43,9	39,4	34,1	21,5	13,1	9,8
Frauen	26,1	37,9	33,6	35,2	30,0	14,4	8,0	4,5

<b>Häufigkeit des Passivrauchens (2006) (%) <sup>1b)</sup></b>		
		<b>Gesamt</b>
zu Hause	(fast) täglich	7,9
	1-3 x pro Woche	3,9
am Arbeitsplatz	(fast täglich)	19,7
	1-3 x pro Woche	12,9
in der Freizeit	(fast täglich)	2,1
	1-3 x pro Woche	26,3
Raucher stören	stark	41,2
	weniger stark	32,3
	gar nicht	26,6
Meidung von Orten, an denen viel geraucht wird		57,7

<b>Trends der 30-Tage-Prävalenz des Rauchens in Gesamtdeutschland, 1990-2009 (%) <sup>1a)</sup></b>						
	Alter	Erhebungsjahr				
		1997	2000	2003	2006	2009
Gesamt	18-59	36,8	34,9	33,9	33,1	30,3
Männer	18-59	43,4	39,0	37,1	37,3	34,1
Frauen	18-59	30,2	30,6	30,5	28,8	26,4

<b>Trends der 30-Tage-Prävalenz des Rauchens von 20 oder mehr Zigaretten pro Tag in Gesamtdeutschland, 1990-2009 (%) <sup>1a)</sup></b>						
	Alter	Erhebungsjahr				
		1997	2000	2003	2006	2009
Gesamt	18-59	14,0	11,1	11,3	9,6	7,1
Männer	18-59	19,5	14,2	14,3	12,9	9,0
Frauen	18-59	8,4	7,8	8,3	6,4	5,3

<b>Aufhörversuche (letzte 12 Monate, mindestens einmal) 2003 <sup>2)</sup></b>	
Männer	30 %
Frauen	28 %

<b>Benutzte Hilfsmittel, um mit dem Rauchen aufzuhören <sup>2)</sup></b>	
Entwöhnungskurs oder Seminar	0,8 %
Nikotinpflaster	9,1 %
Nikotinkaugummi	7,6 %
Bücher, CD etc.	10,9 %
Hypnose	0,2 %
Akupunktur, Akupressur	1,7 %
Unterstützung durch den Partner etc.	17,7 %
andere Hilfsmittel	6,2 %
keine Hilfsmittel	62,0 %

<b>Risikofaktoren für Rauchen <sup>4)</sup> - Raucheranteile in %</b>				
niedriger Bildungsgrad (Altersgruppe 18-59 Jahre)	18-39 Jahre		40-59 Jahre	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen
	48,6	42,7	42,2	42,9
Langzeitarbeitslosigkeit (> 12 Monate)	Männer		Frauen	
	72,4		59,0	
Alleinerziehende	Männer		Frauen	
	51,7		53,1	
Alleinlebende	Männer		Frauen	
	46,5		39,7	
<b>Bestimme Berufsgruppen</b>	<b>Raucherquote</b>			
Männer: Gebäudereiniger, Raumpfleger, Restaurantfachleute, Stewards, Maler und Lackierer, Gerüst-, Beton- und Stahlarbeiter	50-60 %			
Frauen: Gastronomieberufe, Verkaufs-, Pflegeberufe	40-50 %			

## 2.3 Raucheranteil Jugendliche und junger Erwachsener (12-25 Jahre) 2008<sup>5)</sup>

<b>12-15 Jahre: Rauchen Lebenszeitprävalenz (%) <sup>5)</sup></b>	
Männer	60,9
Frauen	62,0
Gesamt	59,8

	<b>Raucherquote (%)</b>											
	<b>Altersgruppe</b>									<b>Gesamt 12-25 Jahre</b>		
	<b>12 - 15 Jahre</b>			<b>16-17 Jahre</b>			<b>18-21 Jahre</b>					
Raucher	alle 8,9	w 9,3	m 8,5	alle 26,5	w 28,0	m 25,1	alle 47,5	w 44,6	m 40,6	alle 32,0	w 32,8	m 31,2
ständige Raucher	alle 3,4	w 3,9	m 2,9	alle 9,8	w 9,5	m 10,0	alle 26,8	w 26,3	m 27,3	alle 19,1	w 18,4	m 19,9

<b>Starke Raucher (10 Zigaretten und mehr pro Tag) (%) 12-25 Jahre (2008)</b>					
Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
			12-15 Jahre	16-17 Jahre	18-21 Jahre
13,8	15,6	11,9	2,0	6,3	18,6

Von allen Rauchern rauchen 47,6 % 10 Zigaretten und mehr.

<b>Starke Raucher (20 Zigaretten und mehr pro Tag) (%) 12-25 Jahre (2008)</b>					
Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
			12-15 Jahre	16-17 Jahre	18-21 Jahre
3,7	4,3	3,1	0,1	1,3	5,4

Von allen Rauchern rauchen 10,6 % 20 Zigaretten und mehr.

<b>Raucheranteil 1997-2008 (%) 12-25 Jahre</b>								
	Erhebungsjahr							
	1997		2001		2004		2008	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
12-17 Jahre	27	29	27	28	24	23	15	16
18-25 Jahre	54	47	47	42	45	44	42	44

<b>Rauchverhalten nach Schulformen: Sek I (%)</b>			
Hauptschule	Realschule	Gesamtschule	Gymnasium
18,3	18,8	9,6	4,3

<b>Raucherquote im Zeitverlauf - Ständige und gelegentliche Raucher (%) 12-25 Jahre</b>					
Erhebungsjahr					
1973	1986	1997	2001	2004	2008
58	45	41	37	35	32

<b>Trends des Rauchens 2008 (%)<sup>5)</sup> 12-17 Jahre</b>						
	Erhebungsjahr					
	1979	1989	2001	2004	2007	2008
Raucher	30	24	28	23	18	17
Nichtraucher	42	55	41	49	57	

<b>Shisha-Rauchen (Wasserpfeife): 12-17 Jahre(2007/2008) (%)</b>		
	2007	2008
Lebenszeitprävalenz	37,5	39,7
letzte 12 Monate	30,9	33,0
letzte 30 Tage	14,0	12,2
wöchentlich (letzter Monat)	3,0	2,0
täglich (letzter Monat)	0,4	0,2

## 2.4 Alter bei Konsumbeginn 12-19 Jahre (BZgA, Juli 2006) <sup>6)</sup>

Erhebungsjahr	erste Zigarette	tägliche Raucher
2005	12,9 Jahre	14,8 Jahre
2003	12,9 Jahre	14,6 Jahre

### Bereitschaft aufzuhören (12-19 Jahre) (BZgA, Juli 2006) (%)

in den nächsten 30 Tagen: 24	in den nächsten 6 Monaten: 35
---------------------------------	----------------------------------

### Aufhörversuche 12-19 Jahre in den letzten 12 Monaten (2005) (BZgA, Juli 2006) (%)

51
----

### Rauchen nach Schulart, 12-19 Jahre (BZgA, Juli 2006) (%)

	Hauptschule	Real- /Gesamtschule (Sek. 1)	Gymnasium (Sek. 1)	Gymnasium Oberstufe	Berufsschule
Ständige und gelegentliche Raucher	23	18	11	32	50

### Bereitschaft aufzuhören (nächste 6 Monate) 2004 (12-25 Jahre) (%)

Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
			12-15 Jahre	16-19 Jahre	20-25 Jahre
64	63	65	74	65	63

### Absicht aufzuhören (nächste 30 Tagen) 2004 (12-25 Jahre) (%)

Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
			12-15 Jahre	16-19 Jahre	20-25 Jahre
29	31	27	39	29	29

### Gründe für das Rauchen 2004 (%)

Rauchen steckt an, wenn man mit anderen zusammen ist	52
beruhigt	46
schafft Wohlbefinden	33
es macht Spaß mit Freunden zu rauchen	29
kann man nicht ablenken	27
hält schlank	26
hilft, schwierige Situationen zu überstehen	24
schmeckt	20
bewirkt Konzentration	11
macht sympathisch	3

### 3. Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential

#### 3.1 Medikamentenabhängigkeit: 1,4 - 1,9 Mio. <sup>4)</sup>

4-5 % aller verordneten Arzneimittel besitzen ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential (u. a. Schlaf- und Beruhigungsmittel (Tranquilizer) mit Wirkstoff aus der Familie der Benzodiazepine, Antidepressiva, kodeinhaltige Schmerzmittel). Rund 25-30 % dieser Mittel wird langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugserscheinungen verordnet. Rund 1,1-1,2 Mio. Menschen sind von Benzodiazepinderivaten, weitere 300.000-400.000 von weiteren Arzneimitteln abhängig. Die Verordnung erfolgt zunehmend auf Privatrezept.

#### Schlaf- und Beruhigungsmittel 2008

Anzahl der verkauften Packungen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln,	28,9 Mio.
davon	
- mit Benzodiazepin oder benzodiazepinähnlichen Wirkstoffen	19,9 Mio. (59 %)
- pflanzliche Mittel	9,0 Mio. (41 %)
Industrieumsatz in Mio. €	123,0 Mio.
Apothekenumsatz in Mio. €	ca. 350,0 Mio.

#### Tranquilizer 2008

Anzahl der verkauften Packungen	11,0 Mio.
Industrieumsatz in Mio. Euro	32,5 Mio.
Apothekenumsatz in Mio. Euro	ca. 250,0 Mio.

#### Benzodiazepinhaltige Arzneimittel 1993-2004

##### Verordnungen von Benzodiazepinhypnotika zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (Trend: Abnahme)

Erhebungsjahr	Mio. Packungen
1993	11,0
2004	3,1

##### Verordnungen im Rahmen von Privatrezepten (Trend: Zunahme)

Erhebungsjahr	Mio. Packungen
1993	1,7
2004	3,1

#### Anmerkung:

Mit der Abnahme der Verschreibung benzodiazepinhaltiger Arzneimittel geht ein Anstieg der Verordnung von Hypnotika mit den Wirkstoffen Zolpidem und Zopiclon mit geringerem Abhängigkeitspotential (nach derzeitigem Kenntnisstand) einher.

#### Schmerzmittel 2008

Anzahl der verkauften Packungen in Mio.	156
davon:	
ohne Rezept	81 %
koffeinhaltig	18 %
Industrieumsatz in Mio. Euro	ca. 560
Apothekenumsatz in Mio. Euro	700

### 3.2 Prävalenz der Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (in den letzten 12 Monaten zumindest einmalige Einnahme) (Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Abführmittel, Appetitzügler) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

	Schmerzmittel	Beruhigungsmittel	Schlafmittel	Anregungsmittel	Appetitzügler
Männer	54,3	3,7	4,4	0,7	0,3
Frauen	69,1	4,9	6,6	0,4	0,6
Gesamt	61,6	4,3	5,5	0,5	0,5

Prävalenz der täglichen Medikamenteneinnahme (letzte 30 Tage) (%) (2009) <sup>1a)</sup>										
	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Schmerzmittel	3,1	3,1	3,2	1,3	2,0	1,4	2,1	2,8	4,9	5,8
Schlafmittel	0,7	0,6	0,7	0,0	0,4	0,3	0,0	0,9	1,2	1,3
Beruhigungsmittel	1,0	1,1	0,9	0,1	0,2	0,0	0,6	1,1	1,6	2,7
Anregungsmittel	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Appetitzügler	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

Prävalenz problematischer Medikamenteneinnahmen (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>										
	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe KFM (≥ 4)	4,0 (2,06 Mio.)	3,6	4,3	2,2	3,7	3,5	2,7	4,2	5,6	3,7
Konsumenten	6,2	6,3	6,1	3,5	5,4	5,0	3,9	6,6	9,3	7,6

5 % der Arbeitnehmer haben bereits chemische Mittel zur Verbesserung ihrer psychischen Leistungsfähigkeit eingenommen wie z.B. Methylphenidat, Modatiniil, Fluoxetin, Metopronol (*Gesundheitsreport DAK 2009*).

Trends der problematischen Medikamenteneinnahme (Gesamtstichprobe, letzte 12 Monate) (%) <sup>1a)</sup>					
	Altersgruppe (Jahre)	Erhebungsjahr			
		2000	2003	2006	2009
Gesamt	18-59	3,3	4,3	4,4	4,1
Männer	18-59	2,6	3,2	3,5	3,6
Frauen	18-59	4,1	5,5	5,4	4,5

## 4. Konsum illegaler Drogen

### 4.1 Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener (12-19 Jahre) (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Juni 2007, Oktober 2008) <sup>8)</sup>

#### a) Cannabiskonsum 12-19 Jahre (%) 2007<sup>7)</sup>

	alle (m+w)	männlich	weiblich
Lebenszeitprävalenz	15,1	18,9	11,0
12-Monats-Prävalenz	8,0	11,1	4,8
30-Tage-Prävalenz	3,4	5,2	1,5
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	2,3	3,6	1,0

#### b) Cannabiskonsum: Differenziert nach Altersgruppen (%) (m+w) 2007<sup>7)</sup>

	Altersgruppe		
	12-13 Jahre	14-17 Jahre	18-19 Jahre
Lebenszeitprävalenz	0,4	12,8	32,3
12-Monats-Prävalenz	0,4	8,4	13,9
30-Tage-Prävalenz	0,1	3,3	6,4
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	0,0	2,3	4,3

#### c) Cannabiskonsum: Differenziert nach Alter und Geschlecht (%) 2007<sup>7)</sup>

	Altersgruppe					
	12-13 Jahre		14-17 Jahre		18-19 Jahre	
	m	w	m	w	m	w
Lebenszeitprävalenz	0,7	-	16,8	8,6	38,9	25,3
12-Monats-Prävalenz	0,7	-	11,8	4,8	18,6	9,0
30-Tage-Prävalenz	0,2	-	5,0	1,5	9,7	3,0
Regelmäßiger Konsum (mehr als 10x im letzten Jahr)	-	-	3,5	1,0	6,9	1,7

#### d) Trends des Cannabiskonsums in % bis 2008 (BZgA, Oktober 2008) <sup>8)</sup>

Erhebungsjahr	Lebenszeitprävalenz	
	Altersgruppe	
	12-17 Jahre	12-25 Jahre
1979	4,9	14,1
1986	3,3	15,6
1993	6,1	16,6
2001	12,8	25,6
2004	15,1	31,1
2008	9,6	28,3

**e) Trends des Cannabiskonsums in % bis 2008 (BZgA Oktober 2008):  
Regelmäßiger Konsum (>10mal im letzten Jahr)<sup>8)</sup>**

Jahr	12-17 Jahre	12-25 Jahre
1993	1,7	4,4
1997	1,9	4,1
2001	3,0	2,0
2004	1,6	3,1
2008	1,1	2,3

**4.2 Konsum illegaler Drogen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
(12-25 Jahre)(%)<sup>7)</sup>**

	Erhebungsjahr	
	2001	2004
Erfahrungen mit illegalen Drogen (insgesamt)	27	32
Cannabis	26	Gesamt: 31 M: 36 F: 27
Ecstasy	4	4
Amphetamine	2	4
Psychoaktive Pflanzen/Pilze	-	4
LSD	2	2
Kokain	2	2
Schnüffelstoffe	1	1
Heroin	0,3	0,3
Crack	0,2	0,2
andere Rauschmittel	3	-

**Illegale Drogen - Konsum (%)**

Altersgruppe	Erhebungsjahr		
	2001 Lebenszeit	2001 letzte 12 Monate	2004 letzte 12 Monate
12-13 Jahre	1	1	12-15 Jahre
14-15 Jahre	12	7	
16-17 Jahre	29	21	16-19 Jahre
18-19 Jahre	38	18	
20-21 Jahre	34	15	20-25 Jahre
22-23 Jahre	38	16	
24-25 Jahre	36	12	
Gesamt	27	13	13 M: 17 F: 10

Ø Alter der ersten Erfahrung (2004): ca. 17 Jahre

<b>Gegenwärtiger Drogenkonsum 2004 (%)</b>	
	<b>illegale Drogen</b>
12-15 Jahre	1
16-19 Jahre	6
20-25 Jahre	6
Gesamt	5 (M: 6, F: 4)

<b>Regelmäßiger Drogenkonsum 2004 (%)</b>	
	<b>illegale Drogen</b>
12-15 Jahre	1
16-19 Jahre	4
20-25 Jahre	4
Gesamt	3 (M: 5, F: 2)

<b>Alter bei erster Erfahrung (in Jahren)</b>			
	<b>Erhebungsjahr</b>		
	<b>2004</b>	<b>2001</b>	<b>1993</b>
Cannabis	16,4	16,5	17,5
Ecstasy	17,3	17,4	-
Amphetamine	17,1	17,6	17,2
andere Rauschmittel	-	17,4	18,3
LSD	17,6	17,3	17,5
Kokain	18,0	18,4	17,3
Schnüffelstoffe	16,4	15,0	15,3
Heroin	-	17,3	-
Crack	-	17,4	-
Psychoaktive Pflanzen/Pilze	17,3		
Aufhören nach 1-2maligen Probieren		45 %	

<b>Erfahrungen mit illegalen Drogen (Lebenszeit) (%)</b>				
	<b>Erhebungsjahr</b>			
	<b>1993</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
Gesamt Deutschland	18	23	27	32
n BL	6	18	24	-
a BL	21	24	28	-

<b>Drogenerfahrung (letzte 12 Monate) %</b>					
	<b>Erhebungsjahr</b>				
	<b>1993</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>	<b>2008</b>
12-25 Jahre	11	12	13	13	
12-17 Jahre	5	10	10	?	7,4

<b>Aktueller Konsum (ab 1993 einschließlich neue Bundesländer) %</b>						
	<b>Erhebungsjahr</b>					
	<b>1973</b>	<b>1986</b>	<b>1993</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
Männer	8	5	10	11	6	6
Frauen	3	3	4	8	4	4

<b>Drogenangebot erhalten haben (%)</b>			
<b>Erhebungsjahr</b>			
<b>1993</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
35	41	48	49

<b>Ablehnung illegaler Drogen (%) („Nehme ich auf keinen Fall“)</b>				
<b>Erhebungsjahr</b>				
<b>1973</b>	<b>1986</b>	<b>1993</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
41	66	60	53	50

<b>Probierbereitschaft (%)</b>					
	<b>Erhebungsjahr</b>				
	<b>1989*</b>	<b>1993</b>	<b>1997</b>	<b>2001</b>	<b>2004</b>
Haschisch	21	26	27	44	47
Ecstasy	2	4	13	12	8
Amphetamine	4	6	7	11	10
LSD	3	3	4	6	5
Kokain	4	5	3	6	6
Heroin	3	2	1	3	4

\*) nur in Westdeutschland

<b>Keine Probierbereitschaft: Drogen erfahrene und -unerfahrene im Vergleich - 2004 („Sollte man auf keinen Fall nehmen“)</b> (%)		
	<b>Drogen erfahrene</b>	<b>Drogen unerfahrene</b>
Haschisch	22	67
Ecstasy	88	92
Amphetamine	88	89
LSD	93	94
Kokain	91	94
Heroin	96	96

<b>Gründe für die Ablehnung von Drogen (%)</b>		
	<b>Erhebungsjahr</b>	
	<b>2001</b>	<b>2004</b>
Kein Interesse	45	43
Angst vor gesundheitlichen Schäden	26	19
Angst vor Sucht	26	20
Unsicherheit/Angst vor Rausch	16	19
Lehne Drogen ab	-	9
Nichtraucher/in	5	5
Schlechtes Ansehen von Drogenkonsumenten	5	9
Angst vor Eltern, Bekanntwerden in Schule/Betrieb	3	6
Angst vor Strafverfolgung	3	6
zu teuer	1	3

<b>Wirkungserwartung nach Geschlecht 2004 (%)</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>
Drogen verschaffen Glücksgefühl	46	51	43
mit Drogen kann man Hemmungen überwinden	40	43	37
mit Drogen erreicht man, dass man alles viel stärker erlebt	30	33	29
mit Drogen kann man gut entspannen	26	30	22
Drogen helfen, Probleme des Alltags zu vergessen	22	23	21
es macht Spaß, mit Freunden Drogen zu nehmen	15	18	12
wer Drogen nimmt, lernt sich besser kennen	6	7	5

#### 4.3.1 12-Monats-Prävalenz illegaler Drogen (%) - Suchtsurvey 2009 <sup>1a)</sup>

	<b>Gesamt</b>	<b>Männer</b>	<b>Frauen</b>	<b>Altersgruppe</b>				
				<b>18-20 Jahre</b>	<b>21-24 Jahre</b>	<b>25-29 Jahre</b>	<b>30-39 Jahre</b>	<b>40-49 Jahre</b>
Cannabis	4,8	6,4	3,1	16,1	14,4	11,1	4,4	2,3
Amphetamine	0,7	1,1	0,4	2,6	3,0	2,1	0,5	0,3
Ecstasy	0,4	0,6	0,2	1,5	1,2	1,2	0,4	0,2
LSD	0,1	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2
Heroin	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1
andere Opiate	0,2	0,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1
Kokain	0,8	1,2	0,4	1,4	2,4	2,0	1,0	0,4
Crack	0,1	0,2	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,2
Pilze	0,2	0,4	0,1	1,0	0,8	0,3	0,1	0,3
Spice	0,4	0,6	0,2	1,9	1,8	1,0	0,3	0,1

#### 4.3.2 Trends der Prävalenz des Konsums illegaler Drogen 1990 - 2006 (Lebenszeit und letzte 12 Monate) der 18-39-Jährigen (%) <sup>1b)</sup>

		<b>Erhebungsjahr</b>				
		<b>1990</b>	<b>1997</b>	<b>2000</b>	<b>2003</b>	<b>2006</b>
Illegale Drogen	Lebenszeit	14,6	18,9	27,7	33,8	34,7
	12 Monate	4,3	7,9	10,8	12,2	9,6
Cannabis	Lebenszeit	14,0	17,6	27,2	33,1	33,9
	12 Monate	4,1	7,2	10,4	11,8	9,2
Amphetamine	Lebenszeit	2,8	2,1	3,0	4,6	4,0
	12 Monate	0,4	0,8	1,0	1,6	1,2
Ecstasy	Lebenszeit	-	2,8	2,8	4,4	4,3
	12 Monate	-	1,5	1,2	1,4	0,9
LSD	Lebenszeit	1,8	1,8	2,3	3,1	2,3
	12 Monate	0,1	0,6	0,3	0,4	0,2
Opiate	Lebenszeit	1,4	1,1	1,4	1,9	1,4
	12 Monate	0,1	0,5	0,4	0,5	0,4
Kokain/Crack	Lebenszeit	1,3	2,0	3,7	4,8	4,1
	12 Monate	0,3	1,1	1,5	1,5	1,2

#### 4.3.3 30-Tage-Prävalenz illegaler Drogen (2006) (%) <sup>1b)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe		
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre
Irgendeine illegale Droge	2,5	3,5	1,5	9,2	8,0	5,1
Cannabis	2,2	3,1	1,3	8,7	7,3	4,5
andere Drogen als Cannabis	0,7	1,0	0,3	1,8	2,1	1,4
Amphetamine	0,3	0,5	0,1	1,6	1,3	0,9
Ecstasy	0,2	0,3	0,0	0,6	0,9	0,1
LSD	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Heroin	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Methadon	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Opiate	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
Kokain	0,2	0,3	0,1	0,4	0,8	0,4
Crack	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Pilze	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3

#### 4.3.4 Cannabisabhängigkeit nach SDS (Severity of Dependence Skala) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe	1,2 (619.000)	1,6	0,8	5,5	3,0	3,7	1,1	0,3	0,2	0,1
Konsumentenanteil	29,6	30,5	27,8	38,8	23,3	36,9	26,2	17,3	25,6	100,0

#### 4.3.5 Kokainabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe	0,2 (103.200)	0,2	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	0,1
Konsumentenanteil	26,1	18,8	51,9	51,2	35,6	20,8	9,6	45,8

#### 4.3.6 Amphetaminabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) <sup>1a)</sup>

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe	0,1 (51.600)	0,2	0,1	0,8	0,4	0,7	0,0	0,0
Konsumenten	26,1	21,5	36,6	44,5	17,7	36,6	0,0	0,0

#### 4.4 Konsumenten harter Drogen <sup>9)</sup>: Drogen- und Suchtbericht 2009

Konsumenten harter Drogen (ohne Cannabis)	250.000 - 300.000
davon: drogenabhängige Personen	ca. 175.000
Anzahl der Cannabis-Konsumenten	ca. 2,4 Mio.
davon: abhängiger Konsum	ca. 600.000

#### 4.5 Rauschgiftdelikte 1999 - 2008 <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Rauschgiftdelikte (Verstöße gegen BTMG)	239.951	248.355	255.019	276.740	283.708	255.575	246.518	244.336	226.563	216.682
davon: konsumnahe Delikte (z.B. Besitz, Erwerb, Abgabe)	71 %									
Handelsdelikte (z.B. Handel, Schmuggel etc.)	13 %									

#### 4.6 Anteil an Rauschgiftkriminalität

	Erhebungsjahr	
	1999	1998
Anteil von Konsumenten harter Drogen an der Rauschgiftkriminalität	35 %	35,2 %

#### 4.7 Rauschgiftsicherstellungen <sup>4)</sup> (inkl. Vergleich zum Vorjahr)

	Erhebungsjahr									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Heroin	796 kg (0 %)	836 kg (+ 5 %)	519,6 kg (- 37,8 %)	626 kg (+ 21 %)	775 kg (+ 8 %)	787 kg (+ 2 %)	879 kg (+ 12 %)	1.074 kg (+ 22 %)	503 kg (- 53 %)	758,4 kg (+ 50,8 %)
Kokain	913,4 kg (- 53,8%)	1.288 kg (+ 41 %)	2.135,7 kg (+ 65,8 %)	1.009 kg (- 53 %)	969 kg (- 4 %)	1.079 kg (+ 11 %)	1.717 kg (+ 59 %)	1.888 kg (+ 9 %)	1.069 kg (- 43 %)	1.707 kg (+ 59,7 %)
Crack	2,2 kg	2,1 kg	7,2 kg (+ 242,9 %)	5 kg (- 31 %)	2,5 kg (- 50 %)	5,6 kg	ca. 4 kg (- 30 %)	ca. 5 kg (+ 23 %)	ca. 8 kg (+ 60 %)	4,6 kg (- 43,9 %)
Amphetamine	ca. 271,2 kg (- 24,7 %)	263 kg	361,7 kg (+ 37,8%)	484 kg (+34 %)	556 kg (+ 15 %)	669 kg (+ 20 %)	723 kg (+ 8 %)	820 kg (+ 13 %)	1.283 kg (+ 56 %)	1.383 kg (+ 7,8 %)
Ecstasy	1,63 Mio. Tabl. (+ 11,2 %)	4,58 Mio. Tabl. (+ 180%)	3,21 Mio. Tabl. (- 29,9 %)	1,26 Mio. Tabl. (- 61 %)	2,05 Mio. Tabl. (+ 63 %)	1,6 Mio. Tabl. (- 23 %)	1,08 Mio. Tabl. (- 32 %)	0,98 Mio. Tabl. (- 9 %)	0,75 Mio. Tabl. (- 24 %)	0,52 Mio. Tabl. (- 30,6 %)
Cannabis/ Marihuana	14,4 t	8,9 t	11,1 t	10,9 t	10,9 t	6,6 t	8,6 t	7,5 t	13,1 t (+ 122 %)	6,5 t (- 50 %)

## 4.8 Rauschgiftkonsum

### Zahl der erstauffälligen Konsumenten harter Drogen 2000 - 2007 <sup>4)</sup>

	Erhebungsjahr									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Zahl der erst-auffälligen Konsumenten harter Drogen	22.584	22.551	20.230	17.936	21.100	19.900	19.319	18.620 davon 15.575m 3.045w	19.203 davon 16.078m 3.125w	18.139

## 4.9 Todesfolge <sup>4)</sup>

Rauschgifttote 1997	(- 12,3 % gegenüber 1996)	1.501 Personen
Rauschgifttote 1998	(+ 11,5 % gegenüber 1997)	1.674 Personen
Rauschgifttote 1999	(+ 8,2 % gegenüber 1998)	1.812 Personen
Rauschgifttote 2000	(+ 12,0 % gegenüber 1999)	2.030 Personen
Rauschgifttote 2001	(- 9,6 % gegenüber 2000)	1.835 Personen
Rauschgifttote 2002	(- 17,5 % gegenüber 2001)	1.513 Personen
Rauschgifttote 2003	(- 2,4 % gegenüber 2002)	1.477 Personen
Rauschgifttote 2004	(- 6,0 % gegenüber 2003)	1.385 Personen
Rauschgifttote 2005	(- 4,0 % gegenüber 2004)	1.326 Personen
Rauschgifttote 2006	(- 2,0 % gegenüber 2005)	1.296 Personen
Rauschgifttote 2007	(+ 8,0 % gegenüber 2006)	1.394 Personen
Rauschgifttote 2008	(+ 4,0 % gegenüber 2007)	1.449 Personen
Rauschgifttote 2009	(- 8,0 % gegenüber 2008)	1.331 Personen

Von den Rauschgifttoten 2009 waren 1.132 männlichen und 199 weiblichen Geschlechts. Todesursächlich im Jahr 2009 waren bei 70 % Überdosierungen mit Heroin bzw. Mischintoxikationen. Das Durchschnittsalter lag bei 36 Jahren.

## 5. Pathologisches Glücksspiel <sup>4)</sup>

### 5.1 Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft (ohne Geldspielautomaten) (Mrd. €)

Erhebungsjahr					
2001	2002	2003	2004	2005	2006
4,59	4,46	4,39	4,36	4,25	4,14

### 5.2 Gesamtumsatz auf dem Glücksspielmarkt (Mrd. €)

Erhebungsjahr							
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
27,8	27,4	27,5	27,4	26,7	27,6	27,9	24,9
davon durch Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen/Gaststätten:							
5,65	5,71	5,78	5,83	5,88	6,88	7,63	8,13
in Spielbanken:							
11,09	10,90	11,11	10,6	10,58	10,45	10,26	8,03

### 5.3. Anzahl pathologischer Glücksspieler an Geldspielautomaten (Schätzung)

Anzahl	zwischen 100.000 - 170.000 Personen
in ambulanter Suchtbehandlung (2008)	ca. 7.300 (+ 28 % zum Vorjahr)
in stationärer Behandlung (2008)	1.131
Anzahl Selbsthilfegruppen	157

### 5.4. Anzahl pathologischer Glücksspieler in Deutschland

**Prävalenzrate 0,29 - 0,64 %, d.h. 100.000 - 290.000**

## 6. Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe <sup>4)</sup>

Art der Einrichtung	Anzahl	Plätze
Beratungsstellen und -dienste (pro Jahr) ca.	945	275.000 Hilfesuchende
Ambulante Behandlungseinrichtungen, anerkannt	470	10.814
Substitutionsbehandlung mit psychosozialer Betreuung (registriert)		72.200
Niedrigschwellige Angebote	450	
Entzug mit Motivationsanteilen	200	6.500
→ davon für Drogenabhängige	80	1.750
Vollstationäre Entwöhnungsplätze		12.000
→ davon für Drogenabhängige		4.000
Adaptionseinrichtungen	80	950
Betreutes Wohnen	275	7.500
→ davon für Drogenabhängige	80	2.750
Einrichtungen für chronisch Mehrfachbeeinträchtigte	200	7.500
Tages- und Nachtambulanz	25	500
Arbeitsprojekte/Qualifizierungsmaßnahmen	100	1.500
Selbsthilfegruppen	> 10.000	150.000

Quelle: Länderkurzberichte über die Situation im Suchtbereich 1998 bis 2004 und Fortschreibungen durch J. Leune

## Literaturquellen:

- 1a) Kraus, L., Pabst, A: Der Epidemiologische Suchtsurvey 2009, Sucht, 56. Jahrgang, Heft 5, Oktober 2010
- 1b) Kraus, L.: Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Verbreitung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Juni 2009
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 10, ISBN 978-87581-310-4, Geesthacht 2010
- 5) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008 - Verbreitung des Tabakkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Mai 2009,
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Förderung des Nichtrauchens, Juli 2006
- 7) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 8) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Cannabiskonsum der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, Kurzbericht, Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 9) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Drogen- und Suchtbericht Mai 2007, Berlin  
Sucht- und Drogenbericht, hrsg. von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 2003
- 10) Schätzverfahren und Schätzungen 1997 zum Umfang der Drogenproblematik in Deutschland, Sucht, 43. Jahrgang, Sonderheft 2, Dezember 1997

---

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.