

Anhang zum Pressestatement 30. Heidelberger Kongress

Abb. 1
Suchtkranke in Deutschland: Schätzungen zu Abhängigkeitserkrankungen (18- bis 64-Jährige)

Substanz	Anzahl	Quelle
Alkohol	1.770.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Medikamente	2.300.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Illegale Drogen – hier: Cannabis / Kokain / Amphetamin	319.000	Pabst, A. et al. (2013): Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. In: Sucht, 59(6), 321-331
Pathologisches Glücksspiel	111.000 – 415.000	Haß, W. & Lang, P.(2016): Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht der BZgA. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Abb. 2
Fachkliniken für Alkohol- / Medikamenten-abhängigkeit: Abhängigkeitsdauer und Anzahl der Entzugsbehandlungen (Basisdokumentation 2014 des Fachverbandes Sucht e.V., Bachmeier et al. 2015)

Abhängigkeitsdauer (N=12.959) vor Antritt einer stationären Entwöhnung	14,3 (+/- 9,8) Jahre
Abhängigkeitsdauer (N=8.202) vor der 1. stationären Entwöhnungsbehandlung	12,9 (+/- 9,5) Jahre
Anzahl der Entzugsbehandlungen (N=17.059) im Vorfeld der stationären Entwöhnung	3,2 (+/- 6,4) Entzugsbehandlungen

Abb. 3
Wahrnehmung schädlicher Wirkungen des Gebrauchs von Alkohol, illegalen Drogen und Medikamenten nach substanzbezogenen Störungen nach DSM-IV (Deutscher Suchtsurvey, Gomes de Matos et al. 2013)

	Abhängigkeit	Missbrauch
Alkohol Problemwahrnehmung	47,8%	19,1%