

Verbrauch, Missbrauch, Abhängigkeit - Zahlen und Fakten (2012)

Inhalt:

1	Alkoholkonsum, -missbrauch, -abhängigkeit	2
1.1	Erwachsene Bevölkerung (18-64 Jahre) (Gesamt 51,6 Mio.)	2
1.2	Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004-2011 : 12-17 Jahre	2
1.3	Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen	3
1.4	Alkoholunfälle im Straßenverkehr	4
1.5	Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner	4
1.6	Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf	5
1.7	Alkoholsteuern in Mio. €	5
2	Tabakkonsum	6
2.1	Daten zum Konsum	6
2.2	Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre	7
3	Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential	8
3.1	Medikamentenabhängigkeit	8
3.2	Prävalenz der Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (2009)	8
4	Konsum illegaler Drogen	9
4.1	Cannabisabhängigkeit	9
4.2	Kokainabhängigkeit	9
4.3	Amphetaminabhängigkeit	10
4.4	Konsumenten harter Drogen: Drogen- und Suchtbericht	10
4.5	Rauschgiftdelikte	10
4.6	Todesfolge	11
5	Pathologisches Glücksspiel und Pathologischer PC-/Internetgebrauch	12
5.1	Pathologisches Glücksspiel	12
5.2	Pathologischer PC-/Internetgebrauch	12
6	Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen	13
7	Leistungen der Suchtrehabilitation 2009 – DRV	14
7.1	Anträge und Bewilligungen DRV (): Entwöhnungsbehandlung	14
7.2	Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV ()	14
7.3	Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahr nach stationärer Alkohol-Entwöhnung 2006 (DRV)	14
7.4	Wirksamkeit der Suchtbehandlung – FVS-Studien	15
8	Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe	16

1 Alkoholkonsum, - missbrauch, -abhängigkeit

1.1 Erwachsene Bevölkerung (18 - 64 Jahre) ^{1a)} (Gesamt: 51,6 Mio.)

N: 8.030, Ausschöpfungsquote 50,1 %

Konsumform: Alkohol im Jahr 2009 (letzte 30 Tage)

Hinweis: 1 Liter Bier enthält 38,1 g Alkohol, 1 Liter Wein 87,3 g, 1 Liter Spirituosen 262,0 g.

Prävalenz des Rauschtrinkens (letzte 30 Tage) (%): Erwachsene (18 – 64 Jahre) (5 oder mehr Gläser Alkohol) 2009 ^{1a)}			
Häufigkeit	Gesamt	Männer	Frauen
0 mal	66,1	53,4	81,5
1-3 mal	21,4	28,4	12,9
4 mal und mehr	12,5	18,2	5,6

Häufigstes Rauschtrinken (4x und mehr) findet bei Männern und Frauen in den Altersgruppen 18-20-Jährige (24,9 %), gefolgt von den 21-24-Jährigen (21,3 %) statt.

Alkoholabhängigkeit/-missbraucher 2006 (DSM IV) ^{1b)} in %			
	Gesamt	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre
Anteil Alkoholabhängiger	2,4 % (1,2 Mio.)	3,4	1,4
Anteil Alkoholmissbraucher	3,8 % (1,9 Mio.)	6,4	1,2

1.2 Alkoholkonsum der Jugendlichen 2004 - 2011: 12-17 Jahre (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) ³⁾

1.2.1 Konsum alkoholischer Getränke von 5 oder mehr Gläsern an 1 Tag (Binge-Trinken) im letzten Monat (%) ³⁾

Gesamt (12-17 Jahre): Binge-Trinken 2004-2008					
	Erhebungsjahr				
	2004	2005	2007	2008	2011
alle (m + w)	22,6	19,6	25,5	20,4	15,2
weiblich	18,7	15,2	20,0	17,7	10,5
männlich	26,3	23,8	30,7	23,0	19,6

Häufiges Rauschtrinken (mindestens 4mal in den letzten 30 Tagen) (%)				
Jahr	2008		2011	
Altersgruppe (Jahre)	12-17	18-25	12-17	18-25
alle (weiblich + männlich)	5,8	13,8	3,7	12,9
weiblich	4,0	6,6	2,1	5,4
männlich	7,6	20,7	5,1	20,1

Alkoholrausch in letzten 30 Tagen (%) 12-15 Jahre			
	2004	2008	2011
Gesamt	12,8	8,0	5,6
weiblich	11,8	8,1	4,5
männlich	13,8	7,9	6,7

1.2.2 Alkoholvergiftungen von Kindern und Jugendlichen (10-20 Jahre) Krankenhausfälle

Jahr	2000	2004	2007	2008	2009	2010
Anzahl	9.500	17.931	23.165	25.700	26.428	25.995

1.3 Sozioökonomische Daten zu Alkoholfolgen ⁴⁾

Mortalität pro Jahr	Alkohol	ca. 40.000		
	Alkohol und Tabak	ca. 73.700		
Volkswirtschaftliche Kosten alkoholbezogener Krankheiten (ohne Kriminalität und intangible Kosten) 2007, davon:		ca. 26,7 Mrd. €		
- direkte Kosten (Behandlung, Sachschäden / Verkehrsunfälle, Rettungsdienst etc.)		10,0 Mrd. €		
- indirekte Kosten (Ressourcenverluste, z.B. Verlust an Arbeitsleistung, Frühberentung, Arbeits-, Erwerbsunfähigkeit)		16,7 Mrd. €		
Arbeitsunfähigkeitsfälle		850.000		
Rehabilitationsmaßnahmen		40.000		
Krankenhausfälle (F 10 Diagnosen) 2008		333.800		
Stationäre Behandlung aufgrund von Alkoholintoxikation (10-19jährige) 2008		25.709		
Frühberentungen		5.000		
Straftaten unter Alkoholeinfluss ⁴⁾ : 2010		alle Straftaten	davon: mit Alkoholeinfluss	in % von allen Straftaten
Gewaltkriminalität gesamt		194.373	61.824	31,8
davon (Auswahl):				
- Gefährliche oder schwere Körperverletzung		159.119	54.298	34,1
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung		6.675	1.858	27,8
- Totschlag und Tötung auf Verlangen		1.872	697	37,2
- Mord		834	131	15,7
Sachbeschädigung		163.028	44.133	27,1
Alle Tatverdächtigen		2.152.803	284.128	13,2

1.4 Alkoholunfälle im Straßenverkehr (ab 0,3 Promille Blutalkohol bzw. 0,15 mg/l Atemalkoholkonzentration): 2001-2010 ⁴⁾

	Erhebungsjahr									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
mit Personenschaden (Anteil Frauen ca. 12%)	25.690	25.333	24.245	22.548	22.004	20.685	20.785	19.603	17.434	15.070
dabei Getötete	909	932	817	704	603	599	565	523	440	342
Häufigste Altersgruppe bei Unfällen mit Personenschäden (2010)										21-24 Jahre
Häufigste Wochentage (2010)										Samstag 24,2 % Sonntag 23,7 %

1.5 Konsum alkoholischer Getränke je Einwohner im Jahr 1999 - 2010 ⁴⁾ in Litern

	Erhebungsjahr											
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Bierkonsum	107,4	109,6	111,1	111,8	116,1	115,3	115,9	117,5	121,5	122,4	125,5	127,5
Weinkonsum	20,5	20,1	20,7	20,6	20,1	19,9	20,1	19,8	20,3	19,8	19,0	18,0
Schaumwein	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,2	4,1	4,9
Spirituosen- konsum	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,9
Pro-Kopf- Verbrauch Alkohol in Litern	137,2	139,0	141,2	141,6	145,6	144,6	145,5	147,0	151,6	152,8	154,4	156,3
Pro-Kopf- Verbrauch reiner Alkohol	9,6	9,7	9,9	9,9	10,1	10,0	10,1	10,2	10,4	10,4	10,5	10,6
Einnahmen an alkoholbezogenen Steuern	3.149 Mio. €	3.305 Mio. €	3.325 Mio. €	3.115 Mio. €	3.391 Mio. €	3.380 Mio. €	3.445 Mio. €	3.450 Mio. €	3.411 Mio. €	3.459 Mio. €	3.507 Mio. €	3.660 Mio. €
Werbeausgaben für alkoholische Getränke	525 Mio. €	471 Mio. €	552 Mio. €	557 Mio. €	510 Mio. €	564 Mio. €	526 Mio. €	525 Mio. €	560 Mio. €	575 Mio. €	597 Mio. €	555 Mio. €

1.6 Rangfolge ausgewählte Länder: Mittlerer Alkoholkonsum pro Kopf in Liter reinem Alkohol 2008 im Alter von 15 Jahren und mehr ⁴⁾

	Registrierter Konsum	Nichtregistrierter Konsum
1. Estland	16,24	1,80
2. Tschechien	14,99	1,48
3. Litauen	13,30	3,00
4. Russische Föderation	11,50	4,73
5. Rumänien	12,15	4,00
6. Ungarn	12,12	4,00
7. Slowenien	11,94	3,00
8. Irland	13,92	1,00
9. Polen	10,73	3,70
10. Portugal	11,79	2,10
18. Deutschland	11,14	1,00

1.7 Alkoholsteuern in Mio. € ⁴⁾

	Erhebungsjahr											
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Biersteuer	713	730	739	757	778	777	787	786	812	828	844	846
Schaum- weinsteuer	422	446	430	371	421	424	436	432	420	457	478	546
Brannt- weinsteuer	2.014	2.129	2.156	1.987	2.192	2.179	2.222	2.232	2.149	2.143	2.151	2.233
Gesamt	3.149	3.305	3.325	3.115	3.391	3.380	3.445	3.450	3.381	3.428	3.472	3.625

2. Tabakkonsum

2.1 Daten zum Konsum

2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
83,6 Mrd. (-3,5%)	86,6 Mrd. (-1,6%)	87,9 Mrd. (-3,8%)	91,5 Mrd. (-2,1%)	93,4 Mrd. (-2,5%)	95,8 Mrd. (-14,3%)	111,7 Mrd. (-15,8%)	ca. 132,6 Mrd.	ca. 142,5 Mrd.	ca. 142,5 Mrd.	ca. 139,6 Mrd.

Feinschnitt (in t) ⁴⁾

Erhebungsjahr										
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
25.486 (+4,4%)	24.403 (+11,7%)	21.849 (-2,4%)	22.381 (-1,4%)	22.762 (-31,7%)	33.232 (+37,0%)	24.265 (+30,4%)	18.603 (+20,2%)	15.473 (-4,9%)	16.273 (+11,4%)	14.611 (+4,4%)

Pfeifentabak (in t) ⁴⁾

Erhebungsjahr										
2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
756 (-6,3%)	806 (-57,2%)	1.883 (+17,0%)	1.608 (+74,5%)	922 (+14,7%)	804 (-9,1%)	884 (+1,6%)	870 (+2,7%)	847 (-8,4%)	925 (+1,7%)	909 (-7,5%)

Einnahmen Tabaksteuern 2000 - 2010 (Mio. €) ⁴⁾ (Netto)

	Erhebungsjahr										
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Zigaretten	11.874	12.1410	12.261	12.862	12.974	12.387	12.540	13.353	13.205	11.432	10.886
Zigarillos/ Zigarren	65	62	86	111	83	65	56	45	46	39	37
Feinschnitt	1.391	1.329	1.167	1.232	1.291	1.772	1.007	676	514	570	489
Pfeifentabak	23	24	50	43	26	24	23	21	21	22	23
Gesamt	13.355	13.556	13.563	14.248	14.375	14.247	13.626	14.095	13.771	12.063	11.436

Ausgaben für Tabak 1999 - 2010 (Mio. €) ⁴⁾

	Erhebungsjahr											
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Zigaretten	19.200	19.625	19.425	19.992	19.913	19.533	19.961	21.078	21.578	19.861	19.176	19.579
Zigarillos/ Zigarren	656	625	720	823	783	664	653	569	566	499	507	469
Feinschnitt	2.583	2.436	2.170	2.162	2.339	3.708	2.217	1.472	1.058	1.140	990	923
Pfeifentabak	84	88	145	132	95	85	94	91	86	95	92	98
Gesamt	22.522	22.775	22.460	23.110	23.130	23.989	22.925	23.209	23.285	21.595	20.765	21.069

Ausgaben der Tabakindustrie für Werbung, Promotion und Sponsoring ⁴⁾	
	2009 in €
Gesamt	222.263.153
davon:	
- Direkte Werbung	81.345.793
- Werbung in Printmedien	1.535.929
- Außenwerbung	70.982.825
- Werbung im Kino	2.300
- Werbung im Internet	277.480
- Sonstige Werbung	8.494.372
- Promotion	137.495.499
- Sponsorship	3.421.861

¹⁾ Tabakwerberichtlinie der EU: Anfang 2007 Werbeverbot für Tabakerzeugnisse in Hörfunk und Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Internet. Auch Sponsoring von Veranstaltungen mit grenzüberschreitender Wirkung (z.B. Formel-1-Rennen) ist untersagt. Weiterhin möglich ist z.B. Kino-, Plakatwerbung, Sponsoring regionaler Veranstaltungen.

2.2 Verteilung der Raucher, Exraucher und Nichtraucher: 18-64 Jahre

Anteil der Raucher und Konsumfrequenz (18-64 J, 2009) ^{1a)}			
	Gesamt	Männer	Frauen
Raucher	29,2 % (15,07 Mio.)	32,8 %	25,5 %
Konsumfrequenz der Raucher (letzte 30 Tage)			
Nicht täglich	29,6 %	28,4 %	31,0 %
Täglich bis 10	21,7 %	17,4 %	27,1 %
Täglich 11-19	23,5 %	25,7 %	20,9 %
Täglich 20 und mehr	25,2 %	28,5 %	21,1 %

Anteil Raucher/innen (12 -17 Jahre), BZgA 2012 in % ³⁾				
Jahr	1997	2007	2008	2011
Gesamt	28,1	17,7	15,4	11,7
weiblich	28,9	17,5	16,2	12,4
männlich	27,4	17,8	14,7	11,1

Anteil der Personen mit einem positiven Befund für Nikotinabhängigkeit nach DSM IV (%) (2009) (18 – 64 J.) (Gesamtstichprobe und Raucher der letzten 30 Tage) ^{1a)}										
	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppe						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe DSM IV Abhängigkeit	6,3 (3,35 Mio.)	6,8	5,8	7,9	8,6	9,7	6,9	5,8	5,3	2,4
Raucher DSM IV Abhängigkeit	19,9	19,2	20,9	26,6	19,9	22,8	20,1	18,7	18,8	14,9

3. Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential

3.1 Medikamentenabhängigkeit: 1,4 - 1,9 Mio. ⁴⁾

4-5 % aller verordneten Arzneimittel besitzen ein eigenes Missbrauchs- und Abhängigkeitspotential (u. a. Schlaf- und Beruhigungsmittel (Tranquilizer) mit Wirkstoff aus der Familie der Benzodiazepine, Antidepressiva, kodeinhaltige Schmerzmittel). Rund 33-50 % dieser Mittel wird langfristig zur Suchtunterhaltung und zur Vermeidung von Entzugserscheinungen verordnet. Rund 1,1-1,2 Mio. Menschen sind von Benzodiazepinderivaten, weitere 300.000-400.000 von weiteren Arzneimitteln abhängig. Die Verordnung erfolgt zunehmend auf Privatrezept.

Schlaf- und Beruhigungsmittel 2009

Anzahl der verkauften Packungen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, davon	28,1 Mio.
- mit Benzodiazepin oder benzodiazepinähnlichen Wirkstoffen	19,5 Mio. (69 %)
- pflanzliche Mittel (z.B. Baldrian, Hopfenextrakte)	8,5 Mio. (31 %)
Industrieumsatz in Mio. €	119,0 Mio.
Apothekenumsatz in Mio. €	ca. 200,0 Mio.

Tranquilizer 2009

Anzahl der verkauften Packungen	10,5 Mio.
Industrieumsatz in Mio. Euro	30,5 Mio.
Apothekenumsatz in Mio. Euro	ca. 200,0 Mio.

3.2 Prävalenz der Einnahme von Medikamenten mit psychoaktiven Wirkungen (in den letzten 12 Monaten zumindest einmalige Einnahme) (Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Abführmittel, Appetitzügler) (%) (2009) ^{1a)}

Prävalenz problematischer Medikamenteneinnahmen (letzte 12 Monate) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe KFM (≥ 4)	4,0 (2,06 Mio.)	3,6	4,3	2,2	3,7	3,5	2,7	4,2	5,6	3,7
Konsumenten	6,2	6,3	6,1	3,5	5,4	5,0	3,9	6,6	9,3	7,6

5 % der Arbeitnehmer haben bereits chemische Mittel zur Verbesserung ihrer psychischen Leistungsfähigkeit eingenommen wie z.B. Methylphenidat, Modatinil, Fluoxetin, Metopronol (*Gesundheitsreport DAK 2009*).

Trends der problematischen Medikamenteneinnahme (Gesamtstichprobe, letzte 12 Monate) (%) ^{1a)}

	Altersgruppe (Jahre)	Erhebungsjahr			
		2000	2003	2006	2009
Gesamt	18-59	3,3	4,3	4,4	4,1
Männer	18-59	2,6	3,2	3,5	3,6
Frauen	18-59	4,1	5,5	5,4	4,5

4. Konsum illegaler Drogen

12-Monats-Prävalenz des Konsums verschiedener illegaler Drogen bei Jugendlichen von 12-17 Jahren (Drogenaffinitätsstudie 2008, BZgA, 2010) und bei Erwachsenen von 18-64 Jahren (Epidemiologischer Suchtsurvey 2009, Pabst et al., 2010) nach Geschlecht ⁴⁾

	Drogenaffinitätsstudie 2008			Epidemiologischer Suchtsurvey 2009		
	(12 bis 17 Jahre)			(18 bis 64 Jahre)		
	Gesamt	Männlich	Weiblich	Gesamt	Männlich	Weiblich
Irgendeine illegale Droge	7,4	9,4	5,2	5,1	6,7	3,4
Cannabis	6,6	8,7	4,4	4,8	6,4	3,1
Andere Drogen als Cannabis	2,0	2,3	1,7	1,3	1,9	0,8
Amphetamine	0,6	0,7	0,5	0,7	1,1	0,4
Ecstasy	0,8	0,8	0,8	0,4	0,6	0,2
LSD	0,3	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1
Heroin	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
Andere Opiate	-	-	-	0,2	0,2	0,1
Kokain	0,8	1,1	0,5	0,8	1,2	0,4
Crack	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,0
Schnüffelstoffe	0,4	0,3	0,5	-	-	-
Pilze	0,9	0,8	0,9	0,2	0,4	0,1
Spice	-	-	-	0,4	0,6	0,2

30 Tage Prävalenz des Cannabiskonsums bei Jugendlichen (BZgA 2012) ³⁾

Jahr	1997		2008		2011	
Alter	12 – 25 J.	12 – 17 J.	12 – 25 J.	12 – 17 J.	12 – 25 J.	12 – 17 J.
Gesamt	7,7	4,8	3,7	2,6	4,0	1,9
weiblich	6,0	6,4	2,6	2,1	2,9	1,2
männlich	9,4	3,3	4,8	3,1	5,2	2,5

4.1 Cannabisabhängigkeit nach SDS (Severity of Dependence Skala) (%) (2009) ^{1a)} 18 – 64 Jahre

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen						
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre
Gesamtstichprobe	1,2 (525.000 - 750.000 Personen)	1,6	0,8	5,5	3,0	3,7	1,1	0,3	0,2	0,1
Konsumentenanteil	29,6	30,5	27,8	38,8	23,3	36,9	26,2	17,3	25,6	100,0

4.2 Kokainabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe (52.000-135.000 Personen)	0,2	0,2	0,1	0,6	0,7	0,4	0,1	0,1
Konsumentenanteil	26,1	18,8	51,9	51,2	35,6	20,8	9,6	45,8

4.3 Amphetaminabhängigkeit (Severity of Dependence Skala) (letzte 12 Monate) (%) (2009) ^{1a)}

	Gesamt	Männer	Frauen	Altersgruppen				
				18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre
Gesamtstichprobe (45.500-133.000 Personen)	0,1	0,2	0,1	0,8	0,4	0,7	0,0	0,0
Konsumenten	26,1	21,5	36,6	44,5	17,7	36,6	0,0	0,0

4.4 Konsumenten harter Drogen: Drogen- und Suchtbericht 2012 ⁹⁾

Konsumenten harter Drogen (ohne Cannabis)	200.000
davon: drogenabhängige Personen	ca. 175.000
Problematischer Cannabis-Konsum (18 - 64 Jahre)	525.000 – 750.000 (1,2%)
abhängiger Konsum von Cannabis (18 – 64 Jahre)	220.000 (0,4%)

4.5 Rauschgiftdelikte 1999 - 2010 ⁴⁾

	Erhebungsjahr											
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Rauschgiftdelikte (Verstöße gegen BTMG)	231.007	235.842	239.951	248.355	255.019	276.740	283.708	255.575	246.518	244.336	226.563	216.682
davon: konsumnahe Delikte (z.B. Besitz, Erwerb, Abgabe)	165.880	169.689										
Handelsdelikte (z.B. Handel, Schmuggel etc.)	49.622	50.965										

4.6 Todesfolge ⁴⁾

Drogentote 1997	(- 12,3 % gegenüber 1996)	1.501 Personen
Drogentote 1998	(+ 11,5 % gegenüber 1997)	1.674 Personen
Drogentote 1999	(+ 8,2 % gegenüber 1998)	1.812 Personen
Drogentote 2000	(+ 12,0 % gegenüber 1999)	2.030 Personen
Drogentote 2001	(- 9,6 % gegenüber 2000)	1.835 Personen
Drogentote 2002	(- 17,5 % gegenüber 2001)	1.513 Personen
Drogentote 2003	(- 2,4 % gegenüber 2002)	1.477 Personen
Drogentote 2004	(- 6,0 % gegenüber 2003)	1.385 Personen
Drogentote 2005	(- 4,0 % gegenüber 2004)	1.326 Personen
Drogentote 2006	(- 2,0 % gegenüber 2005)	1.296 Personen
Drogentote 2007	(+ 8,0 % gegenüber 2006)	1.394 Personen
Drogentote 2008	(+ 4,0 % gegenüber 2007)	1.449 Personen
Drogentote 2009	(- 8,0 % gegenüber 2008)	1.331 Personen
Drogentote 2010		1.237 Personen
Drogentote 2011	(- 20,0 % gegenüber 2010)	986 Personen

Von den Rauschgifttoden 2011 waren 837 männlichen und 144 weiblichen Geschlechts. Todesursächlich im Jahr 2011 war bei 279 Menschen eine Überdosierung von Heroin, bei weiteren 290 eine Überdosis von Heroin in Verbindung mit sonstigen Drogen und gesundheitliche Langzeitschäden bei 211 Menschen. Das Durchschnittsalter lag bei 37 Jahren.

5. Pathologisches Glücksspiel und Pathologischer PC-/Internetgebrauch

5.1 Pathologisches Glücksspiel ⁴⁾

5.1.1 Einnahmen des Staates aus Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuern der Unterhaltungsautomatenwirtschaft (ohne Geldspielautomaten) (Mrd. €)

Erhebungsjahr						
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2009
4,59	4,46	4,39	4,36	4,25	4,14	3,206

5.1.2 Gesamtumsatz auf dem Glücksspielmarkt (Mrd. €)

Erhebungsjahr								
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
27,8	27,4	27,5	27,4	26,7	27,6	27,9	24,9	23,9
davon durch Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen/Gaststätten:								
5,65	5,71	5,78	5,83	5,88	6,88	7,63	8,13	8,35
in Spielbanken:								
11,09	10,90	11,11	10,6	10,58	10,45	10,26	8,03	6,86

5.1.3. Anzahl pathologischer Glücksspieler an Geldspielautomaten (Schätzung)

Anzahl	zwischen 100.000 - 170.000 Personen
in ambulanter Suchtbehandlung (2009)	ca. 9.500
in stationärer Behandlung (2009)	1.307
Anzahl Selbsthilfegruppen	181

5.1.4. Anzahl pathologischer Glücksspieler in Deutschland (2011) ⁹⁾

Prävalenzrate (16 – 64 Jahre) 264.000
--

5.2 Pathologischer PC-/Internetgebrauch

Anzahl pathologischer PC-/Internetgebraucher (2011) ⁹⁾

Anzahl pathologischer PC-/Internetnutzer (14 – 64 Jahre)	14 – 64 Jahre	550.000 (1,5%)
nach Geschlecht in %	Männer 1,3 %	Frauen 1,7%
nach Alter (14-24 Jahre)	Männer 3,0 %	Frauen 4,5 %

6. Krankenhausbehandlungen aufgrund des Konsums psychotroper Substanzen nach Altersgruppen, 2008

Alter	F10 Alkohol	F11 Opioide	F12 Cannabinoide	F13 Sedativa/ Hypnotika	F14 Kokain	F16 Halluzinogene	F18 Lösungsmittel	F19 Multiple Substanzen	
unter 15	4665	17	93	43	4	9	25	90	
15-25	38.370	5.095	4.072	826	322	270	50	10.430	
25-35	34.178	13.337	1.550	1.291	603	109	28	16.004	
35-45	84.074	8.348	445	1.983	351	51	15	10.746	
45-55	104.791	2.801	109	2.094	88	20	14	4.018	
55-65	45.274	538	21	1.238	18	11	9	676	
über 65	22.452	640	7	1.819	2	12	11	435	
Summe	333.804	30.776	6.297	9.294	1.388	482	152	42.399	424.592

Quelle: Statistisches Bundesamt

7. Leistungen der Suchtrehabilitation 2010 – Deutsche Rentenversicherung (DRV)

7.1 Anträge und Bewilligungen DRV (2010): Entwöhnungsbehandlung


• Anträge 2010	109.503
• Bewilligungen 2010	82.164

7.2 Abgeschlossene Entwöhnungsbehandlungen DRV (2010)

• Abgeschlossene Leistungen 2010	56.997
a) davon: ambulant	10.594
stationär	46.403
b) davon: Männer	44.167
- Alkohol	29.779
- Drogen	9.345
- Mehrfachabhängige	4.855
- Medikamente	188
Frauen	12.830
- Alkohol	9.900
- Drogen	1.783
- Mehrfachabhängige	925
- Medikamente	222

Hinweis: Der Anteil der DRV als Leistungsträger an der Entwöhnungsbehandlung beträgt über 80 %.

7.3 Sozialmedizinischer Verlauf 2 Jahre nach stationärer Alkohol-Entwöhnung 2006 (DRV)



Bereich Reha-Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik

7.4 Wirksamkeit der Suchtbehandlung – FVS-Studien Entlassjahrgang 2009 ¹⁰⁾

Die Erfolgsquote wird nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie berechnet. Nachfolgend werden folgende Berechnungsformen verwendet:

DGSS 1: Hier werden alle Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung zugrunde gelegt.

DGSS 4: Hier wird der gesamte Entlassjahrgang zugrunde gelegt, Nichtantworter und widersprüchliche Informationen werden generell als rückfällig eingestuft.

Während die Berechnungsform DGSS 1 eine Überschätzung des Behandlungserfolgs bedeutet (nur Katamneseantworter mit planmäßiger Beendigung gehen ein), resultiert aus DGSS 4 eine Unterschätzung des Behandlungserfolgs (alle Nichtantworter bzw. widersprüchliche Informationen werden als rückfällig gewertet). Der „wahre“ Wert wird somit zwischen diesen beiden Ergebnissen liegen.

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Behandlungsformen (stationär, ambulant, ganztägig ambulant/teilstationär) sind nicht direkt vergleichbar, da sich die Klientel hinsichtlich der Patientenmerkmale voneinander unterscheidet.

7.4.1 Effektivität der stationären Suchtrehabilitation – hier: Fachkliniken für Alkohol/Medikamente 1 Jahr nach Behandlungsende (Missel, P., Schneider, B. et al., SuchtAktuell 01.12)

Katamneseantworter (Anteil)	58,5 %, 10.961 Patienten
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	79,3 %
DGSS 4	45,1 %

7.4.2 Effektivität der ambulanten Suchtrehabilitation (Missel, P., Schneider, B. et al., SuchtAktuell 01.12)

Katamneseantworter (Anteil)	69,0 %, 445 Patienten
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	80,1 %
DGSS 4	48,8 %

7.4.3 Effektivität der ganztägig ambulanten / teilstationären Suchtrehabilitation (Schneider, B., Knuth, S. et al., SuchtAktuell 01.12)

Katamneseantworter (Anteil)	54,5 %, 279 Patienten
Katamnestiche Erfolgsquote nach Berechnungsform „Abstinent bzw. abstinent nach Rückfall“ *	
DGSS 1	74,2 %
DGSS 4	43,0 %

* Für das Kriterium „abstinent nach Rückfall“ wurde die Zeitdauer von zuletzt mindestens 30 Tage Abstinenz nach dem erfolgten Rückfall verwendet.

8. Übersicht über die zentralen Angebote der Suchthilfe ⁴⁾ (J. Leune 2012)

Art der Einrichtung	Anzahl	Plätze
Beratungsstellen und -dienste (pro Jahr) ca.	> 1.300	
Substitutionsbehandlung mit psychosozialer Betreuung (registriert)		77.400
Niedrigschwellige Angebote	> 300	
Entzug mit Motivationsanteilen	190	> 2.000
Spezialisierte Krankenhausabteilungen	> 300	> 7.500
Vollstationäre Entwöhnung	320	13.200
Ganztägig ambulanten Entwöhnung	100	> 1.000
Adaptionseinrichtungen	115	> 1.200
Ambulantes Betreutes Wohnen	460	> 12.000
Stationäre Einrichtungen für chronisch Mehrfachbeeinträchtigte	268	> 10.700
Teilstationäre Einrichtungen der Sozialtherapie	112	> 1.200
Tages- und Nachtambulanz	25	500
Arbeitsprojekte/Qualifizierungsmaßnahmen	250	> 4.800
Selbsthilfegruppen	> 10.000	150.000

Literaturquellen:

- 1a) Kraus, L., Pabst, A: Der Epidemiologische Suchtsurvey 2009, Sucht, 56. Jahrgang, Heft 5, Oktober 2010
- 1b) Kraus, L.: Epidemiologische Suchtsurvey 2006, Sucht, Jahrgang/Volume 54, Sonderheft 1, Januar 2008
- 2) Kraus, L., Augustin, R.: Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey 2003: Sucht, Jahrgang 51, Sonderheft 1, März 2005
- 3) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland, Februar 2012, Köln
- 4) Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 12, ISBN 978-87581-310-4, Lengerich 2012
- 5) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008 - Verbreitung des Tabakkonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Mai 2009,
- 6) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Förderung des Nichtrauchens, Juli 2006
- 7) Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2004, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), Teilband Alkohol, Teilband Illegale Drogen, Köln 2004
- 8) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Cannabiskonsum der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, Kurzbericht, Juni 2007, ergänzt durch: dies.: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, Oktober 2008
- 9) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung: Drogen- und Suchtbericht Mai 2012, Berlin
- 10) Fachverband Sucht e.V.: **SuchtAktuell**, Jahrgang 19, 01.12

Hinweis: Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt aus obigen Quellen zusammengestellt. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben etc. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie durch den Fachverband Sucht e.V. Jegliche Verantwortung und Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten werden ausgeschlossen.